

SOLD BY

J. B. BAILLIERE,

Foreign Bookseller,

219, REGENT STREET.

D. 5



G. L. Foljambe,
Esq.

Adok 07/08/20
with 25 plates

DI

Very Scarce

15,000

2009

N A T U U R L I J K E
E N N A A R H E T L E V E N
N A U W K E U R I G G E K L E U R D E
A F B E E L D I N G E N
E N
B E S C H R I J V I N G E N
D E R
S P O K E N , W A N D E L E N D E B L A D E N , Z A B E L - S P R I N G -
H A N E N , K R E K E L S , T R E K - S P R I N G H A N E N
e n K A K K E R L A K K E N .

I N A L L E V I E R D E E L E N D E R W E R E L D ,
E U R O P A , A S I A , A F R I K A e n A M E R I K A ,
H U I S H O U D E N D E .

Bij een verzameld en Beschreven

D O O R
C A S P A R S T O L L'.

R E P R E S E N T A T I O N

EXACTEMENT COLORÉE D'APRÈS NATURE

D E S

S P E C T R E S O U P H A S M E S , D E S M A N T E S , D E S S A U T E R E L L E S ,
D E S G R I L L O N S , D E S C R I Q U E T S E T D E S B L A T T E S .

Q U I S E T R O U V E N T D A N S L E S Q U A T R E
P A R T I E S D U M O N D E .

L'EUROPE, L'ASIE, L'AFRIQUE et L'AMÉRIQUE;

Rassemblées et Décrites

P A R
C A S P A R S T O L L'.

A A M S T E R D A M ,
C H E Z J . C . S E P P E T F I L S , *Libraires.*
M D C C C X I I I .

*O Jehova, quam magna sunt
opera tua!*



A F B E E L D I N G E N
E N
B E S C H R I J V I N G E N
D E R
S P O K E N
E N
W A N D E L E N D E B L A D E N.

R E P R E S E N T A T I O N
D E S
S P E C T R E S O U P H A S M E S
E T
D E S M A N T E S
O U
D E S F E U I L L E S A M B U L A N T E S.

-XCOY

THE
FEDERAL
BUREAU OF
INVESTIGATION
UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE
WASHINGTON, D. C. 20535

REPORT
OF THE
SPECIAL AGENTS
IN CHARGE
OF THE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE
WASHINGTON, D. C. 20535

VOOR-

VOORBERIGT. INTRODUCTION.

Dewyl de Liefhebbers der Natuurlyke Historie, de Afbeeldingen en beschryvingen van de *Cicaden* en *Wantzen*, wel met hunne goedkeuring hebben willen vereeren, en my bovendien door veele myner Begunstigers aanzoek is gedaan, om ook de *Wandelende-Bladen*, *Springhaanen* enz. te doen afbeelden en uitgeven. Zo heb ik my dierhalven aan dien billyken Eisch niet kunnen onttrekken, maar integendeel getracht om aan de verwagtinge in zo verre te voldoen, naar maate het myne weinige kragten zullen toelaaten, te meer, daar veele van de voornoemde Insecten in eene menigte van andere kostbaare Werken, zodanig zyn verspreid, dat 'er geen gering vermoegen toe vereischt word, om dezelve alle magtig te worden; terwyl men integendeel byna alle reeds bekende en veele nieuwe zoorten, hier, als by elkander zal kunnen vinden.

De Afbeeldingen zullen alle naar Natuurlyke Voorwerpen, die zich in onze Nederlandsche Kabinetten bevinden, en door dezelve Tekenaars en Plaatsnyders, welke myne *Cicaden* enz. behandeld hebben, worden gemaakt.

Het oogmerk dan, waartoe men zig in dit Werk zal bepalen, is, het uitgeven der Afbeeldingen van de *Spooken*, of zogenaamde *Scherminkels* (*Spectrum*.) *Wandelende Bladen*, (*Mantes*.) *Zabelspringhaanen*, (*Gryll. Tettigonia* Linn.) *Krekels*, (*Gryll. Acheta* Linn.) *Trekspringhaanen*, (*Gryll. Locustæ* Linn.)

Les Amateurs d'Histoire-naturelle ayant bien voulu accueillir favorablement les Représentations & Descriptions des Cigales & des Punaises, je n'ai pas cru pouvoir me refuser aux vœux de plusieurs de mes Protecteurs, qui m'ont pressé de faire aussi graver & publier les Feuilles-Ambulantes, les Sauterelles &c. je tâcherai au contraire, de satisfaire à leur attente pour autant que mes forces y suffiront; d'autant plus qu'un grand nombre de ces Insectes se trouvent dispersés dans une multitude d'autres Ouvrages dispendieux, au point qu'il faut des moyens plus que médiocres pour pouvoir se les procurer tous, tandis qu'on pourra trouver ici, comme rassemblées, presque toutes les especes déjà connues & beaucoup de nouvelles.

Tous les Dessins seront faits d'après nature, sur des objets qui se trouvent dans les Cabinets de nos Provinces & exécutés par les mêmes dessinateurs & graveurs qui ont traité mes Cigales &c.

L'on se bornera donc, dans cet ouvrage à publier les représentations des Spectres, (*Spectrum*). Des Feuilles-Ambulantes, (*Mantes*.) Des Sauterelles, (*Gryll. Tettigonia* Linn.) Des Grillons, (*Gryll. Acheta* Linn.) Des Criquets, (*Gryll. Locustæ* Linn.) & des Blattes ou Kakkerlacs (*Blattæ*.) Tous ces Gen-

en de *Kakkerlakken*, (*Blattæ*.) Alle deze Geslachten zullen zo veel als de omstandigheden het zullen toelaaten, agtervolgens uitgegeven worden; om op die wyze eene Systematische schikkinge te behouden.

De Heer LINNÆUS heeft alle de voorgemelde Insecten in het *Systema Naturæ* Ed. 12. Tom. I. Pars. II. pag. 358. en pag. 689. in de Tweede Orde van deszelfs Rangschikkinge, onder de benaaming van *Hemiptera*; het welk gemeenlyk voor Halfschildige of Halfdekvleugelige word genomen: deze beduiding kan egter in dien zin hier geen plaats vinden, om dat de Dekschilden van deze Insecten niet half, maar geheel Lederagtig zyn, en niet gelyk aan die der *Cicaden* en *Wantzen*, welke de Dekschilden naar de tippen, meer dan de helft vliesachtig en doorschynent hebben. Het blykt egter in *Loc. Cit.* pag. 357. dat die groote Natuurkundige ten aanzien van deze Dieren door het gemelde *Woord* ook heeft bedoelt de dunne lederagtige en minder harde Vleugelschilden dan die der *Torren*, welke zyn Ed. onder de benaaming van *Coleoptera* had bepaalt, en 'er byvoegt dat dezelve zyn *Hardschildig* met een regte Naad (*Crustaceæ futura recta*) integen overstelling van dat der volgende Orde waar van gezegt word dat zy hebben *Alæ superiores, simicrustaceæ incumbentes*, Half korstige of Dunschildige vleugeldekken: en deze Omschryving kan ook met Recht eenig op de hier bovengenoemde Geslachten der Insecten worden toegepast; offchoon het woord *Hemiptera*, voor zo verre het ons

res paroitront, autant qu'il se pourra successivement, afin de suivre un ordre Méthodique.

Monsieur LINNÆUS a (dans son *Systhéma Naturæ*. Ed. 12. Tom. I. Pars II. pag. 358 & pag. 689.) rangé tous ces Insectes dans la seconde Classe de sa Méthode sous la dénomination d'Hemipteres qui se prend communément pour demi-Etuis; signification qui ne sauroit s'appliquer ici, parce que les Etuis de ces Insectes ne sont pas à demi, mais entièrement Velineux & non comme ceux des Cigales & Punaïses, qui ont la grande moitié, vers l'extrémité, membraneux & transparents. Il paroît cependant in *Loc. Cit.* pag. 357 qu'à l'égard de ces animaux, ce grand Naturaliste désigne aussi par ce mot les Etuis minces, velineux & plus mols que ceux des Scarabées qu'il avoit rangé dans la classe des Coléopteres ajoutant qu'ils sont écailleux ou crustacées, à suture droite (*Crustaceæ Sutura recta*) en opposition de ceux de la Classe suivante, desquels il est dit qu'ils ont alæ Superiores simicrustaceæ incumbentes, des Etuis demicrustacées ou d'écaille molle, se repliant l'un sur l'autre: & cette periphrase peut aussi en quelque sorte s'appliquer à tous les susdits genres d'insectes; quoique, selon nous, le mot Hemiptere conviendrait mieux aux caractères distinctifs des Cigales, Punaïses & des autres Insectes de cet ordre, parce que les premiers different si essentiellement des derniers par leur manière de vivre, & que d'ailleurs leur bouche est pourvue de Machoires ou Pincés, tandis que celle des autres est non seulement d'une construction toute dif-

VOORBERIGT.

toefchynt. met meerder eigenschap aan de kenmerken der *Cicaden*, *Wantzen* en die der overige Insecten van dien Rang zoude kunnen toegekent worden, om Reden dat de eerstgemelde zoo aanmerkelyk in hunne levenswyze met de laatste zyn onderscheiden en ten tweeden, dat derzelver mond met bewegende kaakebeenen of Nypers is voorzien daar die der anderen van een geheel verschillend maakzel is, niet alleen, maar bloot in een soort van Pomp of zuiger bestaat, waarmede zy de zappen der Planten of Dieren naar zig toe trekken en uitzuigen.

Om van geene andere Autheuren te gewagen, welke in de bovengemelde Rangschikkinge den Heere LINNEUS gevolgt hebben, zo zullen wy alleen met den Heer DE GEER (*) de hier door ons uitgegeven Insecten bepaalen tot eene byzondere *Classe* ofte *Orde*, onder de Benaming van *Dermaptera*, Lederagtige, van het grieksche woord *Derma*, *Leder*, om dat de Dekschilden der Vleugels Pergament- of lederagtig zyn; en in de eerste Plaats beginnen met het

EERSTE GESLACHT.

DE SPOOKEN. SPECTRUM.

De *Spooken* die van zommigen ook, wegens het dunne Lyf en zeer lange Pooten, *Scherminkels* worden genaamt, zyn tot nu toe altoos verward met de *Wandelendebladen*, al hoewel zy merkelyk van elkander zyn onderscheiden,

(*) DE GEER *Inf. Tom. III. pag. 399.*

INTRODUCTION. 8

différente, mais ne consiste même qu'en une espèce de Trompe, au moyen de la quelle ils attirent ou sucent les suc des plantes & des animaux.

Sans faire mention des autres Auteurs qui ont suivi Monsieur LINNÉUS dans cette méthode, nous rangerons, avec Mr. De Geer, () les Insectes que nous donnons ici, dans une Classe particulière, sous la denomination de Dermapteres, Velineux, du mot grec Derma, cuir, parce que les Etais des ailes sont d'une consistance de cuir, ou de velin, & commencerons en premier lieu par le*

PREMIER GENRE.

LES SPECTRES. SPECTRUM.

Les Spectres, qui à cause de leur corps effilé, & a très longs pieds, sont aussi nommés par quelques uns squellettes, ont été jusqu'ici toujours confondus avec les Feuilles Ambulantes quoiqu'il y ait entre eux des différences considérables, comme
ge-

gelyk wy hier na zullen aanwyzzen en volgens duidelyke kenmerken dezelve bepaalen en verdeelen. Deze Insecten verschillen in hunne levenswyze en huishouding zeer veel van de *Wandelen-debladen*, doordien zy het Gras, Planten en de bladen der Boomen tot hun voedsel gebruiken, hunne Eyêren in de Aarde leggen, evengelyk de *Trekspringhaanen*. (*Gryll Locust. Linn.*) De *Leg* waarmede de Wyfjes zulks verrigten is niet ongelyk aan die der evengemelde Springhaanen, behalven dat dit lid is bewaard of gedekt door eenen in drie bladen verdeelden laatsten Ring aan 't Agterlyf: en bovendien hebben zy nog de volgende

ALGEMEENE KENMERKEN.

- (1) Borstelagtig Sprieten, bestaande uit langwerpige leden.
- (2) Een grooten Eyronde Kop,
- (3) De mond met beweegende Kaakebeenen of Nypers, en met vier Baardsprieten of Proevertjes voorzien.
- (4) Kleine Netswyze Oogen, voor aan den Kop geplaatst.
- (5) Drie kleine Blinkende Oogjes in een Driehoek tusschen de Netswyze geplaatst.
- (6) Het geheele Lyf spilrond en van gelyke dikte.
- (7) Ses Pooten om mede te loopen
- (8) Vyf leden aan de Voeten.
- (9) De Dekschilden lederagtig, zeer kort, bedekkende naauwlyks het derde gedeelte van 't Agterlyf. De Ondervleugels aan de buiten randen lederagtig. het overige derzelven waayer-vormig geplooit en byna zo lang als 't Agterlyf

nous l'indiquerons dans la suite, en les divisant & Classant selon leurs caractères distinctifs. Ces Insectes different beaucoup des Feuilles Ambulantes, par leur maniere de vivre & par leur Oeconomie, vu qu'ils se nourrissent d'Herbes, de Plantes & de feuilles d'arbres, & déposent leurs œufs en Terre tout comme les Sauterelles, (*Gryll. Locust. Linn.*) La Tariere dont les Femelles se servent pour cela ne differe guere de celle des sauterelles, excepté qu'elle est couverte au dernier anneau de l'abdomen le quel est divisé en trois lames: outre cela ils ont encore les suivantes

CARACTERES DISTINCTIFS.

- (1) Des Antennes Soyeuses composées d'articles oblongs.
- (2) Une grosse Tête ovale.
- (3) La Bouche pourvue de Machoires mouvantes & de quatre Barbillons ou Antennules.
- (4) De petits yeux à réseau, placés vers le devant de la Tête.
- (5) Trois petits yeux lisses, disposés en triangle entre ceux à réseau.
- (6) Le corps entier en forme Cilindrique.
- (7) Six pieds pour marcher.
- (8) Cinq articles aux Tarfes.
- (9) Les Etais Velineux, très courts, couvrant à peine le tiers de l'abdomen. Les ailes inferieures velineuses aux bords extérieurs, le reste plissé en éventail & presque aussi long que l'abdomen.

Be-

V O O R B E R I G T.

Behalven deze algemeene kenmerken kunnen deze Insecten nog in twee byzondere Gezinnen verdeelt worden, als het:

EEERSTE GEZIN.

De voorste pooten langer dan de agtersten. Het Agter lyf rolrond. (zie Plaat. I. Fig. I. en Pl. V. Fig. 17.)

TWEEDE GEZIN

Het Lyf plat. zie Plaat V. Fig. 18 en Pl. VII. Fig. A. B. C. De voorste Pooten korter dan de agtersten, van eenige soorten hebben de Wyfjes de Dekschilden zo lang als de Vleugels.

Wat de voortteeling van deze Insecten aangaat daarin komen zy met de Wandelende bladen en de volgende geslachten zo verre mede overeen, dat zy wynig verschillen van de Springhaanen en krekels. Uit het Ey voortgekomen vertoonen zy zig niet als wormen, gelyk de Maskers van de Torren en dergelyken, als grootelyks in gedaante verschillende van het volmaakte Insect. Het voornaamste onderscheid met hunne moeder bestaat daarin, dat zy klein en geheel ongeveugeld zyn; in dezen eersten Staat, welke men dien van masker noemen kan, leven en groejen zy zy voort en vervellen eenige maalen, tot dat zy dien van Pop of Nymph berryken, als wanneer zy de zogenaamde Stompjes of vleugelscheden bekomen, waarin de Dekschilden en Vleugels zyn

I N T R O D U C T I O N. 5

Outre ces Caracteres généraux, ces Insectes peuvent encore être distingués en deux Familles particulieres comme:

PREMIERE FAMILLE.

Les pieds antérieurs plus longs que les postérieurs. Le Corps tout-à-fait cylindrique: Voyez, pl. I fig. I & pl. V. fig. 17.

SECONDE FAMILLE.

Le corps plat. voyez planche V fig. 18 & planche VII fig. A. B. C. Les pieds antérieurs plus courts que les postérieurs. Dans quelques Espèces les Femelles ont les Étais aussi longs que les aîles.

Quand à la propagation, ces Insectes se rapprochent des Feuilles-Ambubulantes & des genres suivans, en ce qu'elle differe peu de celle des Sauterelle & des Grillons. Au sortir de l'oeuf ils ne paroissent pas sous la forme de vers, comme les Larves des scarabées, & autres semblables, dont la forme differe beaucoup de celle de l'insecte parfait: la principale différence qu'il y ait entr'eux & leur mere, consiste en ce qu'ils sont petits & entierement dépourvus d'aîles; dans ce premier état, qu'on peut nommer celui de Larve, ils vivent, croissent & se dépouillent plusieurs fois de leur peau, jusqu'à ce qu'ils parviennent à celui de Nymphe ou Chrysalide, en acquérant les petits Boutons ou Fourreaux dans les quels sont enveloppés les Étais & les aîles. Pl. V. fig. 18. Parvenus à leur entier accroissement, la peau se creve pour la dernière fois sur le dos

beslooten; (Pl. V. Fig. 18.) volwassen zynde, barst voor de laatste maal de huid op den Rug open en het Insect komt daaruit met uitgebreiden Dekschilden en Vleugels ten voorschyn, waarna zy zig paaren, leggen Eyer en hebben aldus hunnen volmaakten Staat berykt. Wy hebben reets boven gemeld dat de *Spooken* hunne Eyeren gelyk de *Trek-springhaanen* in de Aarde leggen, thans zullen wy hier met wynig woorden byvoegen op welke wyze de *Wandelende Bladen* daarmede te werk gaan: Het wyfje legt zyne Eyeren op gehoopt in een halfrond Bondeltje, dat aan de eene zyde Plat is, en waarin twee ryen zyn van langwerpige Bolletjes, overdwars geplaatst, met eene overlangse ry van schubben, die Dakswyze over elkan- der liggen. en de zamenvoeging van de twee ryen der Eyeren bedekken, dit geheele Bondeltje is ligt, en als uit dun Pargement bestaande, gemeenlyk aan een Grashalm of dergelyke steel, aan de Platte zyde vast gehegt. Uit deze Eyer- nesten komen na verloop van eenigen Tyd de jongen voort, die reets de gedaante der Ouden hebben, doch zonder vleugels, welke zy eerst, gelyk van 't voorgaande Geslacht, na de laatste verwisseling der huid bekomen. Zy zyn zeer Roofzugtig, want nog klein zynde vallen zy op de plantluizen aan en verflinden dezelve; groot geworden, zyn de vliegen, Jonge Springhaanen en andere Insecten hun voedsel, Ja vervolgen zelfs die van hun eigen soort, gelyk de Spinnekoppen meede doen. Men heeft opgemerkt dat een paar, mannetje en Wyfje zynde, in een zuiker-glas waren

et l'Insecte paroît avec les aîles et les Etuis déployés, après quoi ils s'accouplent, pondent et sont ainsi parvenus à leur état parfait. Nous avons déjà observé, ci-dessus, que les Spectres déposent ainsi que les Sauterelles leurs œufs en terre, nous ajouterons maintenant ici en peu de mots, comment les Feuilles Ambulantes y procedent: la Femelle pond ses œufs par tas en un petit paquet Sphérique, qui contient deux rangs de globules oblongs, posés transversalement et couverts dans leur longueur d'un rang d'écaillés posées l'une sur l'autre en forme de toit. Tout ce petit paquet est léger et comme d'une consistance de Velin; attaché d'ordinaire par le côté plat à quelque brin d'herbe ou petit tige. De ces Nids sortent, au bout de quelque tems les petits, qui ont déjà la forme des vieux, à l'exception des aîles qu'ils n'acquirent, ainsi que ceux du genre précédant, qu'après la dernière dépouille. Ils sont très voraces, car encore tout petits ils assaillent les pucerons et les dévorent, devenus grands, les Mouches, les jeunes Sauterelles et d'autres Insectes, et même dans la suite, ainsi que les araignées, ceux de leur propre espece deviennent leur proie. L'on a observé qu'une couple, mâle et femelle, ayant été renfermés dans un Verre à sucre, la femelle après s'être refusée plusieurs fois aux avances du mâle, le saisit enfin avec les griffes aigues de ses pieds antérieurs ou bras, lui emporta la tête et finit par le devorer. Voyez en outre la dessus MERIAN sur. ins. pag. 66. RÖSEL ins. bel. Tom. IV. pag. 89. GEOFFROY Ins. Tom. I. pag. 399. DE GEER Ins. Tom. III. pag. 399. Nous passerons maintenant aux caractères particulieres qui les distinguent

VOORBERIGT.

opgeslooten, het Wyfje na dat zy verscheide maalen de aanzoekingen van 't mannetje had geweigert, ten laatsten het zelve door middel van den scherpen Klaauw aan de voor of vangpooten aangepakt, den Kop afgebeeten, en daar na geheel heeft verslonden. Men gelieve hier over verder na te zien MERIAN *sur. Inf. pag. 66.* RÖSEL *Inf. bel. Tom. IV. pag. 89* GEOFFROY *Inf. Tom. I. pag. 399.* DE GEER *Inf. Tom. III. pag. 399.* Wy zullen nu overgaan tot het opgeven der byzondere kenmerken, waardoor zy meest van het voorgaande Geslacht der *Spooken* zyn onderscheiden.

TWEEDE GESLACHT.

WANDELLENDE BLADEN. (MANTES)

De Algemeene kenmerken zyn

- (1) *Draad vormige Sprieten.*
- (2) *Een nederwaards geboogen hartvormigen kop. met kaakebeenen of Nypers en Baard Sprieten voorzien.*
- (3) *Twee groote uitpuilende Netswyze Oogen op de hoeken van den Kop geplaatst.*
- (4) *Meest al twee kleine Blinkende Oogjes tusschen den wortel der Sprieten geplaatst.*
- (5) *Het Borststuk smal, op den Rug byna kielvormig verheven, de randen van 't zelve plat.*
- (6) *De Dekschilden over elkander liggende en zo lang als de waayerswyze geplooidde vleugels, bedekkende daar mede byna het geheele Agterlyf.*
- (7) *Ses Pooten, waarvan de twee voorsten*

INTRODUCTION. 7

guent le plus du genre précédent des SPECTRES.

SECOND GENRE.

FEUILLES AMBULANTES. (MANTES.)

Les Caracteres distinctif sont

- (1) Des antennes filiformes.
- (2) Une tête en forme de coeur, courbée en avant avec des mâchoires ou pincés & des antenules.
- (3) Deux gros yeux à réseau placés aux coins de la Tête.
- (4) Chez la plus part deux petits yeux lisses entre les racines des antennes.
- (5) Le Corselet étroit relevé le long du dos presque en forme de quille & plat sur les bords.
- (6) Les Etais croisant l'un sur l'autre & presque aussi longs que les ailes plissées en éventail avec les quelles ils recouvrent presque entièrement l'abdomen.
- (7) Six piéds dont les antérieurs, ou
niet

niet tot loopen bekwaam maar aan 't einde, met een scherpen klaauw zyn voorzien en waaraan ter zyden een kraaltje is geplaatst, 't welk uit vyf leeden bestaat; de vier agter pooten zyn dun en ongedoornd.

(8) *vyf Leden aan de voeten.*

Dit Geslacht kan ook in twee Gezinnen verdeelt worden als.

EERSTE GEZIN.

Het Borsstuk in 't midden breeder als aan 't begin en einde. zie Plaat. V. Fig. 19. Een breed en plat Agterlyf. zie Plaat III. Fig. 10. De voorsten of vang-pooten aan de schenkels en Beenen dik of breed en aan de onderranden Scherp gedoornd. (zie Pl. V. Fig. 19 en Pl. VI. Fig. 23.)

TWEEDE GEZIN.

Het Borststuk en Agterlyf van gelyke breette, zynde smal en byna rond. zeer lan- en dunne vangpooten, doch met korte doornen bezet. (zie Plaat. III. Fig. 9 en Pl. V. Fig. 16.)

Van de springhaanen en de Overige boven reets gemeldde Insecten, welke wy ons hebben voorgesteld om uit te geven, zullen wy thans niets zeggen, dewyl by de uitgave van ieder Geslacht telkens in 't byzonder zal gesproken en derzelver kenmerken bepaalt worden. — Voort overige zal ik my dezen Taak getroosten by aldien de Vrienden en verzamelaars van Natuurlyke zeldzaamhe-

bras, ne sont pas propres pour marcher, mais garnies à l'extrémité d'une griffe tranchante, à côté de laquelle il y a un petit fil composée de cinq articles, les quatre pieds postérieurs sont effilés & sans piquans.

(8) Cinq articles aux Tarces.

Ce Genre peut aussi être distingué en deux Familles.

PREMIERE FAMILLE.

Le Corselet plus large vers le milieu qu'au commencement & à la fin. (Voyez planche V. fig. 19) L'abdomen large & plat, (Voyez planche III. fig. 10) Les pieds antérieurs ou bras gros ou larges aux cuisses & jambes & garnis en dessous de fortes épines (Voyez planche V. fig. 19 & pl. VI. fig. 23.)

SECONDE FAMILLE.

Le Corselet & l'abdomen sont d'égale largeur, étant étroits & presque ronds, les Bras très longs & effilés, cependant garnis de courtes épines (Voyez planche III. fig. 9 & planche V. fig. 16).

Nous ne dirons présentement rien des sauteuses ni du reste des Insectes ci-dessus mentionnés, que nous nous proposons de donner au Public, vu qu'il sera parlé de chaque genre en particulier, en les Plaçant d'à près des Caractères distinctifs à mesure qu'ils paraîtront. — au reste, je ne regretterai point mes peines, si les amis & amateurs de Curiosités Naturelles veulent bien non seulement considérer les difficultés d'un pareil
den

den niet alleen, zullen gelieven in te zien; met hoe veele moeite een zodanig werk vergezelt gaat, waarin zulk een groot aantal van voorwerpen vereischt, en welke Juistheid er gevordert word, om de aller kleinste Deelen, van deze Insecten, in het afbeelden gade te slaan; maar dat Zy ook tevens by het aanschouwen en betrachten dezer Schepzelen, niet uit het Oog verliezen de Almachtige Hand van den *Grooten Maker*, die zo veelerly Wezens heeft gewrogt welken onzen Aandagt kunnen en moeten opwekken, om met eene innerlyke Dankbaarheid zyne goedheid te erkennen, waardoor onze verstandelyke vermogens verbeterd, en de kennis van den mensch in *Gods Werken* vermenigvuldigt worden.

CASPAR STOLL.

Ouvrage, qui requiert un si grand nombre d'objets, & exige tant de précision pour observer & rendre jusqu'aux plus petites parties de ces Insectes; mais en même tems ne point perdre de Vuë dans l'examen & l'étude de ces Créatures, la main Toute-puissante du Grand Créateur qui a formé tant d'Etres divers, lesquels peuvent & doivent reveiller notre attention, afin de reconnoître avec une profonde gratitude la Bonté, par la quelle nos facultés intellectuelles sont perfectionnées & les connoissances Humaines multipliées dans les œuvres de Dieu.

CASPAR STOLL.



BESCHRYVING DESCRIPTION
 VAN DE DES
 SPOOKEN. SPECTRES.
 EN ET DES
 WANDELENDE BLADEN. FEUILLES AMBULANTES.

MANTES.

P L A A T I.

Fig. I. DE REUS.

*Van 't Geslacht der Spooken
 en 't Eerste Gezin.*

De Sprieten van deze groote Spook zyn borstelagtig en bruin, de Kop is langwerpig rond, van vooren aschkleurig met donkerbruin gevakt, de Netswyze Oogen zyn bruinagtig rood en vooraan ter zyden van den Kop geplaatst: de Mond is voorzien met twee Kaakebeenen of Nypers en vier Baardsprietjes, van welke laatste de twee ondersten kort doch de twee bovensten meer dan eens zo lang zyn. Tusschen de twee Netswyze Oogen en den wortel der Sprieten vind men, (egter niet, zonder de hulp van een vergrootglas,) drie kleine blinkende Oogjes als in een driehoek geplaatst.

Het Borststuk bestaat uit twee Ringen, zynde het eerste kort en aan 't zelve de twee lange Voorpooten geplaatst; de tweede en langste Ring is van boven ruuw en met verheven puk-

P L A N C H E I.

Fig. I. LE GÉANT.

*Du genre des Spectres.
 Premiere Famille.*

Les Antennes de ce grand Spectre sont brunes & soieuses. La Tête ovale, est sur le devant d'un gris cendré, tacheté d'un brun obscure; les yeux à ré-faux placés de côté sur le devant de la tête, sont d'un rouge brunâtre: la bouche est garnie de deux mâchoires ou pincés & de quatre barbillons ou antennules dont les deux inférieurs sont courts, mais les supérieurs ont plus du double de longueur des premiers. Entre les deux Yeux & la racine des Antennes, l'on découvre, à l'aide d'une Loupe, trois petits Yeux lisse, disposés en triangle.

Le Corselet consiste en deux anneaux, au premier, qui est court, sont joints les deux longs pieds de devant ou antérieurs, le second anneau, plus long que celui-ci, est raboteux en dessus, par-

kels

kels of opwaarts staande stippen bezet, welke aan zommige van deze soort graauw of donkerbruin van kleur zyn, ook heb ik andere gezien die dezelve bleekgroen hadden. Aan 't einde van dezen Ring staan de twee Middelpooten, en een weinig voorwaarts ziet men de inplanting der Dekschilden; aan 't begin van den derden Ring zyn de eigentlyke Vleugels en aan 't einde van denzelven de Agterpooten geplaatst. De overige negen Ringen zyn kort, in vergelykinge der twee naastvoorgaande, en de laatste is aan 't einde in drie schubagtige bladen verdeelt, welke het Teellid der Wyfjes bevatten en bedekken. Het geheele Lyf is spil rond, van boven, doch aan de onderzyde een weinig plat. De Dekschilden zyn lederagtig, aschkleurig en bruine stippen en Aderen van dezelve kleur, hebbende, wegens de uitgesneden randen, de gedaante van een verdord blad. (*) De Vleugels hebben den buitenrand lederagtig, aschkleurig, bruinegevlakt en geadert; het overige gedeelte der Vleugels is Vliesagtig, waaierswyze geplooit, van eene ligte bruinegele grondkleur met donkerbruine dwarsstrepen en vlakken. In den rustenden stand word het Vliesagtig gedeelte geheel door den lederagtigen buitenrand der Vleugels bedekt, gelyk de afbeelding hier dit voorwerp vertoont. De Pooten bestaan, gelyk alle die onder deze Geslachten van Insecten behooren, in Vier Deelen, als (1) de Dye welke aan 't Lyf is ingeplant, (2) de Schen-

(*) Zie Pl. II. Fig. 5.

femmé de petites bossettes, ou points sail-lants, qui dans quelques unes de ces espèces, sont ou grises ou d'un gros brun, j'en ai vû aussi qui les avoient d'un verd pâle. A l'extrémité de cet anneau sont les deux pieds du milieu, l'on voit un peu plus en avant, l'emboiture de l'Etui des ailes; les ailes proprement dites, sont placées au commencement du troisième anneau & à son extrémité, les pieds de derriere ou postérieurs. Les neuf autres anneaux sont courts en comparaison des deux précédents, & le dernier est divisé en trois petites feuilles écaillées, qui renferment & couvrent l'organe Générique de la Femelle. Tout le corps est cylindrique en dessus, mais un peu aplatti en dessous. Les Etuis sont velineux, d'une couleur cendrée parsemée de points bruns & de veines de la même couleur, ressemblant beaucoup, vû ses bords festonnés, à une feuille sèche (). Le bord extérieur des Ailes est cendré, tacheté & veiné de brun, le reste des Ailes est membraneux, replié en forme d'éventail, d'un brun clair jaunâtre, traversé de rayes & de taches d'un brun foncé. Dans l'état de repos, la partie membraneuse est entièrement recouverte par la partie velineux au bord extérieur de l'aile, comme il est représenté ici.*

Les Pieds sont composés de quatre articulations, ainsi que dans tous les Insectes de ce Genre: (1) La Hanche qui tient au corps, (2) la Cuisse, unie à la hanche par une jointure, (3) la Jambe placées entre le genoux & le tarse (4) le Tarse composé de cinq articulations, dont

(*) Voyez Pl. II. Fig. 5.

kel die met een gewrigt aan de Dye is aangehegt, (3.) het Scheenbeen 't welk tusfchen Knie en Voet geplaatst is, en (4.) de Voet die uit Vyf leden bestaat eindigende het laatste lid van denzelven in twee klaauwen, tusfchen welke een rond plaatje, in gedaante gelyk men die aan de Voeten der *Boktorren* (*Cerambyces*,) geplaatst ziet. De voorfte Pooten zyn aan 't begin van den Schenkel eenigermaten uitwaarts geboogen, waardoor veelligt werd veroorzaakt dat deze Pooten eene vrye beweginge hebben om niet den Kop van 't Insect te kunnen aanraaken en waardoor hetzelfde anders, in dien ze van hun beginfel af regt waren, voor zeker eenig letzel zoude ontfangen; Ik ftelle zo veel te meer vertrouwen in dit gevoelen, om dat alle de Spooken van 't Eerfte Gezin, naar maate der Grootte, deze bogt meer of minder hebben. — De Schenkels en Scheenbeenen zyn aan de onderzyde met korte doornen bezet. Uit het maakzel der Pooten en Voeten blykt ten fterkften, dat deze Insecten zeer goed kunnen loopen en tegens de takken der Boomen opklimmen; maar dat dezelve troepswyze de *Rivieren* zouden overzwemmen om langs dien weg hun voedsel op te zoeken, gelyk men ons gaarne willen diets maken (*), dat valt naar onze gedagten een weinig in het wonderbaare, want de ondervinding leert dat meest alle Insecten door zwaare Regen en te veel Vogtig weêr fterven, en wel byzonder die welke

la dernière se termine en deux crochets, entre les quelles est une plattine ou pelotte ronde, semblable à celles qui se voyent aux tarses des Capricornes (*Cerambyx*). Les Pieds de devant, ou antérieurs, sont, depuis l'origine de la Cuisse, un peu courbés en dehors, ce qui contribue probablement à faciliter le mouvement des pieds de l'Insecte, sans heurter sa tête, qui en souffrirait s'ils étoient droits dès le commencement, je tiens d'autant plus à ce sentiment, que tous les Spectres de la première Famille ont plus ou moins cette courbure proportionnée à leur grandeur.

La Cuisse & la Jambe sont garnies en dessous de petits épines il paroît bien évidemment par la conformation des Jambes & des Tarses que ces Insectes sont très-habiles à courir & grimper contre les branches des Arbres; mais que (comme on voudroit nous le faire à croire (*)) elles traversent par Troupes les Rivières à la nâge, pour chercher leur nourriture, cela nous paroît donner dans le merveilleux, car l'expérience prouve que presque tous les Insectes & en particulier ceux de cette Classe, périssent par les fortes pluies & des tems trop humides; il me paroît tout aussi peu croyable, qu'il se trouve de cette espèce d'Insecte de treize pouces de longueur & qui puissent emporter un doigt à ceux qui les approchent; cela n'empêche pas que, vu la grandeur de leur mâchoires ou Pincés, ils ne puissent endommager considérablement les feuilles des arbres & des plantes, surtout lorsqu'ils se trouvent rassemblés en grand nombre, & il paroît

(*) *Poissons des Molucques*, par Mr. RENARD, in folio, Amsterd. 1754. La Sauterelle mâle d'Aïnoine. Pl. 33. n. 155. & la Femelle n. 166.

onder deze Orde behooren, even zo min kan ik ook gelooven dat 'er van deze Dieren zouden gevonden worden van dertien Duimen langen dat zy den geen die ze aanraakt, een Vinger zouden kunnen afbyten; het kan egter zeer wel waar zyn, dat zy door middel van de groote Kaakebeenen of Nypers waarmede zy zyn voorzien, de bladen der Boomen, en Planten merkelyk kunnen beschadigen: te meer wanneer zy in menigte by elkander zig bevinden, en dat dezelve op het Molukkische Eyland *Amboina* niet zeldzaam zyn, blykt, doordien ik veelmaals bezendingen van daar heb gezien, waarby meestal 10 of 12 Stuks van deze soort waren geplaatst. De hier afgebeelde is van het even gemelde Eyland en berust nevens de overigen op deze *Plaat* afgebeelde voorwerpen in het Kabinet van den Heere L. F. HOLTHUIZEN.

LINN. *Syst. Nat.* pag. 689. Gen. 220. *Mantis* no. 1. *Gigas*. RÖSEL. *Inf.* Tom. II. *Saml. ausl. Heuschr.* pag. 120. Tab. 19. Fig. 9. De hier in L. C. afgebeelde is naar een van deze Insecten, welker onderleugels nog niet geheel ontwikkeld waren, gemaakt. GOEZE *Entom. Beytr.* Tom. II. pag. 19. no. 1. FABRICIUS *Spec. Insect.* Tom. I. pag. 345. no. 1.

Fig. 2. DE GLAS - WIEK.

Van 't Geslacht der Wandelende bladen, en 't Eerste Gezin.

De Kop, Borststuk nevens de vier volgende Ringen aan 't Agterlyf hebben eene vuilgroene kleur, de zes laatste zyn bleekgroenagtig geel en plat, het einde van 't Agterlyf is met twee

bien que ces Insectes ne sont pas rares dans l'Isle d'Amboine (l'une des Moluques) puisque j'en ai vu plusieurs fois, des envois où il s'en trouvoit presque toujours dix ou douze de cette Espèce. Celle qui est représentée ici est de cette Isle & se trouve, ainsi que les autres objets, représentés sur cette planche dans le Cabinet de Mr. L. F. HOLTHUIZEN.

LINN. *Syst. Nat.* pag. 689. Gen. 220. *Mantis* no. 1. *Gigas*. RÖSEL. *Inf.* Tom. II. *Saml. ausl. Heuschr.* pag. 120. Tab. 19. Fig. 9. Celui qui se trouve représenté en L'endroit cité a été dessiné d'après un de ces Insectes dont les ailes inférieures n'étoient pas entièrement développées. GOEZE *Entom. Beytr.* Tom. II. p. 19. no. 1. FABRICIUS *Spec. Insect.* Tom. I. pag. 345. no. 1.

Fig. 2. LA MANTE à AILES VITRÉES.

Du Genre des Mantes ou Feuilles Ambulantes. (De la premier Famille.)

La Tête, le Corcelet & les quatre premiers anneaux du corps sont d'un verd sale, les six derniers anneaux sont applatis & d'un verd pâle & jaunâtre; l'extrémité de l'Abdomen, est pourvue de deux bors-

borstelagtige Staartjes voorzien. De Kop, heeft dit Insect zeer klein doch de ronde Netswyze Oogen groot en uitpuilend. Alle de Pooten zyn geelagtig-bruin, de voorsten smal, aan de onderzyde met korte doornen bezet, en eindigen in een scherpen klaauw, die ter zyden een kraaltje heeft, 't welk uit vyf leden bestaat. De buitenranden der Dekschilden zyn lederagtig en bleekgroen, doch voor 't overige Glasagtig en helder doorschynend. Zy is van de *Kaap de Goede Hoop*.

Fig. 3. HET KAAPSCHE DWERGJE.

Van 't Geslacht der Wandelende Bladen, en 't Eerste Gezin.

Heeft bruine Sprieten, de Kop en Borststuk is geelagtig en bruin, de Pooten bruingeel, de voor- of vangpooten breed en onderwaarts, naar maate der grootte, scherp gedoornt. De buitenrand der Dekschilden is lederagtig en bruingeel van kleur, het overige derzelven, nevens de Vleugels, is bruingeel, doorschynend en van eene bruingeelagtige kleur. Men vind ze aan de *Kaap de Goede Hoop*.

FABRICIUS. *Spec. inf. Tom. I. pag. 351. M. Pufilla. Tab. 1. Fig. 9. PALLAS. Spmil. Zoolog. Faes. IX. pag. 15. M. Pufilla.*

Fig. 4. HET GROENE DWERGJE.

Van 't Geslacht der Wandelende Bladen, en 't Eerste Gezin.

De Kop, het Lyf, de Pooten en de Dekschilden zyn donkergroen, de Oo-

petites queuees, la tête de cet Insecte est très-petite, mais ses Yeux ronds à reflets, sont grands & saillants; tous ses pieds d'un brun jaunâtre, ceux de devant sont minces, garnis en dessous de courts épines terminés en une griffe tranchante qui est garnie sur le côté d'un petit fil grainé composé de cinq articles. Les Etais sont velineux & d'un verd pâle aux bords extérieurs, mais tout le reste est diaphane, ou fort transparent. Il est du Cap de Bonne-Espérance.

Fig. 3. LE NAIN DU CAP.

Du Genre des Mantes ou Feuilles Ambulantes. (De la premiere Famille.)

A des Antennes brunes, la Tête & le Corcelet jaunâtres & bruns, les pieds antérieurs, ou bras, larges & à proportion de leur grandeur, fortement garnis d'épines en dessous; le bord extérieur des Etais est écailleux & d'un jaune brun, le reste est, ainsi que les ailes, veiné de brun, transparent & d'un jaune brunâtre. On le trouve au Cap de Bonne-Espérance.

Fig. 4. LE NAIN VERD.

Du Genre des Mantes. (De la premiere Famille.)

La Tête, le Corps & les Pieds sont d'un verd sombre & les ailes noires. Les gen

6 BESCHRYVING

gen bruin, en de Vleugels zwart. De vangpooten heeft zy breed en onderwaarts met korte doornen bezet. De Dekschilden zyn zeer kort in vergelyking der Vleugels, welke langer dan het Agterlyf en zwart gekleurt, maar aan 't einde of de tippen bruingeel en doorschynend. Ik heb deze zoort meermaals van Surinamen ontfangen, doch altoos in dezelve gedaante met korte Dekschilden en volwasfen Vleugels, waardoor het blykt dat dit Insect in den volmaakten staat is.

P L A A T II.

Fig. 5. DE REUS.

Deze afbeelding is naar een van dezelfde zoort als Fig. 1. op de voorgaande Plaat. Zy onderscheid zig alleen in de kleur der Pooten en Dekschilden als mede den lederagtigen buitenrand der Vleugels. Beide afbeeldingen zyn gemaakt naar voorwerpen welk aan my uit Amboina, gedroogt zynde, zyn toegezonden en kunnen dierhalven aan hunne kleuren niet veel verlooren hebben, gelyk dit veeltyds gebeurt aan dergelyke Insecten welke men in Wyngest of Arak bewaart, ontfangt. De groote uitgebreide Vleugels wyzen genoegzaam aan, dat deze Insecten zig ook van dezelfde wel zullen weeten te bedienen, om van den eenen plaats naar den anderen, hun Voedzel te kunnen op zoeken.

DESCRIPTION

Pattes antérieures sont larges & garnies de courtes épines en dessous. Les Etais sont très-courts en proportion des ailes, qui sont plus longues que l'Abdomen, & de couleur noire, mais les bouts ou extrémités sont d'un jaune brun & transparents. J'ai souvent reçu cette espèce de Suriname & toujours sous la même forme, avec les Etais courts & les Ailes entièrement développées, d'où il paroît que cet Insecte est dans l'état parfait.

P L A N C H E II.

Fig. 5. LE GÉANT.

Cette représentation est faite d'après un sujet de la même espèce que la Fig. 1. de la Planche précédentes, il n'en diffère que par la couleur des pieds & des Etais ainsi que par le bord extérieur velineux des ailes. Ces deux figures ont été faites des sujets qui m'ont été envoyés desséchés d'Amboine, & qui ne peuvent par conséquent avoir beaucoup perdu de leurs couleurs, comme il arrive souvent, à ces sortes d'Insectes, que l'on reçoit conservés dans de l'esprit de Vin ou de l'Arack. La grande étendue des Ailes de ces Insectes, indique assez qu'ils savent s'en servir pour aller de lieux en lieux chercher leur nourriture.

Fig.



Fig. 6. HET DUITSCHE DWERGJE.

*Van 't Geslacht der Wandelende Bladen,
en 't Eerste Gezin.*

Heeft kleine zwarte Sprieten, de Kop, en Lyf is geelagtig met bruine Ringen, de Pooten bruin, de vangpooten lang, breed en onderwaarts gedoornt. De smalle lederagtige buitenrand der Dekschilden is bruingeel met een donker bruinen stip, doch de grond derzelven nevens dien der Vleugels is graauw geadert en helder doorschynend. Men vind ze in *Duitschland by Franckfort aan den Main.*

PALLAS *Spicil. Zool. Fasc. IX. pag. 14. Tab. 1. fig. 9. M. Perla.* GOEZE *Entom. Beytr. Tom. II. pag. 33. N. 22. LINN. Syst. Nat. pag. 916. Raphidia N. 2. (Mantispa)?* SULZER *gesch. inf. Tom. I. pag. 178. N. 2. der Slangenkopf Tab. 25. fig. 10?* FABRICIUS *Spec. inf. Tom. I. p. 350. N. 29. M. Pagana.*

Fig. 7. HET SURINAAMSCH DWERGJE.

*Van 't Geslacht der Wandelende Bladen,
en 't Eerste Gezin.*

De Sprieten zyn zwart, de Kop groen, de Oogen zwart en het Borststuk in 't midden geel, aan de randen bruin, het Agterlyf is bruinrood; de vier agterpooten zyn groen en de vangpooten bruinagtig rood. De Dekschilden hebben een donker groenagtige kleur en de Vleugels zyn bleekgroen en doorschynend. Zy is uit *Surinamen*, en berust als de voorgaanden in het Kabinet van den HEER L. F. HOLTHUISEN.

Fig. 6. LE NAIN D'ALLEMAGNE.

(De la premiere Famille.)

A de petites Antennes noires, la Tête & le Corps sont jaunâtres avec des anneaux bruns, les pieds bruns, les Pattes antérieurs longs, larges & épineux en dessous. Le bord velineux des Etais est étroit & d'un jaune brun avec un point d'un brun foncé; mais leur fond est, ainsi, que celui des Ailes, veiné de gris & fort transparent.

On le trouve en Allemagne aux environs de Francfort sur le Main.

Fig. 7. LE NAIN DE SURINAME.

Du Genre des Mantes.
(De la premiere Famille.)

Les Antennes sont noires, la Tête verte, les Yeux noirs & le Corselet jaune au milieu & brun aux bords. L'Abdomen est rouge brun. Les quatre Pieds postérieurs sont verts & les pattes antérieures d'un rouge brunâtre. Les Etais d'un verdâtre foncé & les ailes d'un verd clair & transparentes. Il est de Suriname & se trouve, ainsi que le précédent, dans le Cabinet de Mr. L. F. HOLTHUISEN.

8 BESCHRYVING

P L A A T III.

Fig. 8. HET BONTVLEULIGE
SPOOK, (WYF.)*Van 't Eerste Gezin.*

De Kop is vaalgrauw, de Sprieten borstelagtig en zeer dun, de Netswyze Oogen schoonrood; De eerste Ring aan 't Borststuk is bruin, de tweede bruingeel en met veele verheven pukkels bezet, het Agterlyf nevens de vier Agterpooten zyn aschkleurig, doch aan de Ringen en leden bruin, de Dekschilden hebben eene ligte bruingeel kleur met donkerbruine aderen, alle ses Pooten zyn aan de onderzyde met zwarte doornen bezet. De buitenrand der Vleugels is uitwaarts bruingeel maar inwaarts roodkleurig en lederagtig, het vliesige gedeelte derzelven is bruin paarschkleurig met vuilwitte dwarfstreepen en Vlakken. Deze afbeelding is naar een *Wyfje*, op de volgende *Plaat* zullen wy die van het *Mannetje* geven. Zy woonen op het Eyland *Amboina*, en berust thans nevens de overige hier afgebeelden in het Kabinet van den HEERE L. F. HOLTHUISEN.

Fig. 9. HET VYFVLAKKIGE
WANDELENDE BLAD.*Van 't Tweede Gezin.*

Dit Insect gelykt by de eerste beschouwing naar een *Spook*, wegens het dunne en ronde Lyf, doch het maakzel van den Kop en de vangpooten die in

DESCRIPTION

P L A N C H E III.

Fig. 8. LE SPECTRE A AÎLES
TACHETÉES. (Femelle.)

(De la premiere Famille.)

La Tête est d'un gris fauve, les Antennes soyeuses & fort déliées, les Yeux à réseau d'un beau rouge. Le premier Anneau du Corselet est brun & parsemé de beaucoup de points saillants. L'Abdomen & les quatre pieds postérieurs cendrés, mais bruns vers les anneaux & les articulations. Les Etais sont d'un jaune brun pâle, avec des Veines d'un brun sombre, tous les six pieds sont garnis en dessous d'épines noires. Les bords extérieurs des Aîles sont d'un jaune-brun en dehors, mais rougeâtres en dedans, & velineux, la partie membraneuse est d'un brun pourpré, traversé de tâches en forme de raies d'un blanc sale. Cette figure est d'après une Femelle, nous donnerons celle du Mâle sur la Planche suivante. Ils sont de l'Isle d'Amboine, & se trouvent actuellement, avec les autres sujets de cette planche, dans le Cabinet de Mr. L. F. HOLTHUISEN.

Fig. 9. LA MANTE AUX CINQ
TACHES.

(De la seconde Famille.)

Au premier aspect cet Insecte ressemble au Spectre, vu son Corps cylindrique, mais il en differe, par la forme de la Tête, & les Pattes antérieurs, qui de
een



een scherpen klaauw eindigen en met een fyn kraaltje ter zyden zyn voorzien even gelyk alle die van 't Geslacht der Wandelende-bladen. Zy heeft lange draadvormige Sprietten, de Kop, en 't Lyf is bruin, de Oogen zeer klein en bruinrood, de Pooten lichtbruin. De Dekschilden zyn lederagtig, de Vleugels hebben ieder naar de tippen even onder den buitenrand, drie zwarte vlakken welke door twee bleekgeele worden afgezonderd; van de gewrigtten tot aan de helft der lengte, zyn de Vleugels meer doorschynend, dan op den door bruine streepjes bezetten grond aan het overige gedeelte derzelve. Zy is uit Surinamen.

Fig. 10. HET KLEINE BRUINE WANDELLENDE BLAD.

Van 't Eerste Gezin.

De Sprietten, Kop, Lyf en Dekschilden met de Pooten zyn bruin, de Vangpooten zyn onderwaarts aan de Scheenbeenen en Klaauwen met scherpe doornen gewapent, het Agterlyf is breed, op 't midden bruin met zwarte bruine zyden en Ringen. De Vleugels zyn bruin, met donker bruin geschaduwt en aan de tippen wit. Men vind ze in Surinamen.

terminent en une griffe aiguë & sont pourvus de côté d'un petit fil grainé, fin, comme tous ceux du genre des Mantres. Elle a de longues Antennes filiformes, la Tête & le Corps sont bruns, les Yeux très-petits, rouge-brun & les Pieds brun-clair. Les Etais sont velineux. Les Ailes ont chacune vers le bout, un peu au-dessous des bords extérieures, trois taches noires, séparées par deux autres d'un jaune pâle. La moitié de la longueur des ailes est, depuis la jointure plus transparente que le reste, dont le fond est couvert de petites rayes brunes. Elle est de Suriname.

Fig. 10. LA PETITE MANTE, BRUNE.

(De la première Famille.)

Les Antennes, la Tête, le Corps, les Etais & les Pieds sont bruns, les Jambes & griffes des Pattes antérieures, sont armés en dessous de fortes épines, l'abdomen est large, brun sur le milieu & d'un brun noir sur le côtés & les anneaux. Les Ailes sont brunes, ombrées de brun foncé, & blanches aux extrémités. On la trouve à Suriname.

10 BESCHRYVING

P L A A T IV.

Fig. 11. HET BONTVLEUGELIGE
SPOOK. (Man)

Van 't Eerste Gezin.

Deze is het mannetje van Fig. 8 op de voorgaande III. de Plaat. De sprieten zyn borstelagtig en dikker als die van 't Wyfje, de Kop en 't Lyf is bruin doch de twee laatste ringen aan 't Agterlyf bruinagtig geel. Aan den laatste ring, van onder, is eene Kleine opening, welke 't mannelyke teel-lid bevat en dat de lengte van drie lynen heeft. De ogen zyn bloedrood, een vlak van dezelve kleur is op 't midden van den kop geplaatst; de Dekschilden zyn zeer kort, lederagtig, aschkleurig met zwartgestipt en by de gewrigten rood gerand, de lederagtige buitenrand der vleugels is bruinrood, het overige, met licht en donker paarschagtige kleuren geschaduwde, en met aschkleurige vlakken gesierde gedeelte, is doorschynend. De Pooten zyn bruin en aan de onderzyde gedoornd. Men vind ze op *Amboina* en beruist nevens alle op deze Plaat afgebeelde voorwerpen in het kabinet van den Heere L: F: HOLT-HUISEN.

Fig. 12. HET GRYZE MET ZWARTGE-
VLAKTE WANDELENDE BLAD.

(Van 't Eerste Gezin.)

Dit Insect is nog in den Staat van Nymph en zoude nog eens hebben moe-

DESCRIPTION

P L A N C H E IV.

Fig. 11 LE SPECTRE A AÎLES
TACHETÉES: (Mâle.)

(De la premiere Famille.)

C'est le mâle de la Fig. 8. de la précédente Planche III. Les antennes sont soyeuses & plus grosses que celles de la femelle; la Tête & le Corps bruns, excepté les deux derniers anneaux de l'abdomen, qui sont d'un jaune brunâtre; au bout du dernier anneau il se trouve en dessous, une petite ouverture qui contient le membre viril le quel a trois lignes de longueur. Les yeux sont couleur de sang & il y a une tache de la même couleur sur le milieu de la Tête; les Etais sont très courts, velineux, de couleur cendrée, tiquetée de noir & bordés de rouge vers les jointures, le bord velineux des aîles & d'un rouge brun, le reste ombragé de clair est d'obscur d'une couleur pourprée & décoré de taches cendrées, est transparent. Les pattes sont bruns & épineux en dessous. Il est d'amboine & se trouve avec le reste des objets de cette planche, dans le Cabinet de Mr. L. F. HOLTHUISEN.

Fig. 12 LA MANTE GRISE, TACHETÉE
DE NOIR.

(De la premiere Famille.)

*Cet Insecte est encore dans l'état de Nym-
phe & eut du jubir encore une dépouille après
ten*



ten vervellen, als wanneer hetzelfde de Dekschilden en Vleugels zou bekomen hebben; doch dewyl my hetzelfde in dien volmaakten staat onbekent is, zo heb ik gemeent dezelve als ze is, te doen afbeelden. Zy heeft den kop, Borststuk en Vangpooten grysg met zwarte vlakken en stippen, de Oogen bleekrood, en het op 't midden kielvormig verheven Borststuk heeft aan de platte randen een geelen streep, de Scheeden der Dekschilden en Vleugels zyn zwart, het Agterlyf vaalzwart, de vier Agterpooten bruin, en de scherpe doornen aan de dikke en breede vangpooten zwart, zy is uit *Surinamen*.

Fig. 13. DE NYMPH VAN EEN KAAPSCH WANDELEND BLAD.

(*Van 't Eerste Gezin.*)

Het is waarschynlyk dat dit Insect levend zynde eene groene kleur gehad heeft, en die in bruingeel is veranderd, doordien zy nevens andere Insecten in Arak bewaart van de *Kaap de Goede Hoop* my is toegezonden: de gedaante heeft zeer veele overeenkomst met eene die aan de Kaap zeer gemeen is en van onze *Europische* byna niets verschild. Het Borststuk is op 't midden verheven en kielvormig, de Dekschilden en Vleugels zyn nog in hunne Scheeden beslooten, het Agterlyf is breed. De Sprietten draadvormig en bruin, de Oogen groot en uitpuilend, het geheele dier is bruingeel met donkerbruin gevlaakt: de Vangpooten hebben scherpe doornen.

laquelle il auroit acquis des Etuis & des Ailes, mais comme il ne m'est pas connu dans son état de perfection, j'ai cru devoir en donner la figure telle qu'elle est. Il a la Tête, le Corselet & les pattes gris, avec des taches & points noirs, les Yeux rouge pâle, le Corselet, qui sur le milieu, est élevé en forme de quille de Vaisseau, a une raye jaune sur les bords plats, les fourreaux, des Etuis & Ailes sont noir, l'abdomen noir sauve, les quatre pattes postérieurs bruns, ses gros & larges Pattes antérieures, sont garnis de fortes épines noires. Il est de Suriname.

Fig. 13. LA NYMPHE D'UNE MANTE DU CAP.

(*De la premiere Famille.*)

Il est apparrant que cet Insecte étoit pendant sa vie de Couleur verte, laquelle s'est changée en jaune brun, parce qu'il m'a été envoyé du Cap de Bonne Espérance, avec d'autres Insectes conservés dans de l'Arack: sa forme a beaucoup de rapport, avec une espece qui est fort commune au Cap & ne differe guere de celles que nous avons en Europe. Le Corselet est relevé sur le milieu en forme de quille de Vaisseau. Les Etuis & les Ailes sont encore contenues dans leur fourreaux, l'abdomen est large, les Antennes filiformes & brunes, les Yeux grands & saillans, l'animal entier est d'un jaune brun tacheté de brun obscur; les Pattes antérieures ont de fortes Epines.

Fig. 14. HET BRUINE VERDORDE WAN-
DELENDE BLAD.

(*Van 't Eerste Gezin.*)

Heeft zwarte Sprieten, boven de Oogen zyn twee uitsteekzels welke de gedaante van korte hoornen hebben, hier onder zyn de groote uitpuilende Oogen geplaatst, het Borststuk is rond, en bruin, het Agterlyf is van een zonderlinge gedaante en met roodagtige banden en bruine vlakken, de zyden zyn voorzien met korte styve haren. De uitgesneden Dekschilden hebben in 't midden eene sterke doorlopende Ader, welke nevens de overige kleine dwarsaderen aan deze Schilden de gedaante als van een verdord blad geven; de Vleugels hebben eene bruinagtige paarsche kleur. De Pooten zyn bruin, de Vangpooten lang, breed en binnenwaarts met scherpe doornen gewapent. Zy is uit Surinamen.

Fig. 15. HET CORMANDELSCH DWERGJE.

Van 't Geslacht der Wandelende bladen en 't Eerste Gezin.

Heeft korte draadvormige bruine sprieten, de Kop en 't geheele Lyf is nevens de Pooten bruinrood, de Vangpooten zyn gedoornd, de Dekschilden en de Vleugels vuilgeel, de eerstgemelden hebben aan 't midden van den buitenrand een bruinroode streep. Zy gelijkt, behalven de kleur, veel naar de Fig. 3. op Pl. I. en Fig. 6. op de II^{de} Plaat. Men vind ze op de kust Coromandel.

Fig. 14. LA MANTE FEUILLE
DÉSÉCHÉE BRUNE.

(De la premiere Famille)

A les antennes noires; aux côtés de la tête il y a deux éminences en forme de courtes cornes, sous lesquelles sont placés les gros yeux saillans; le Corcelet est rond & brun, l'abdomen singulièrement figuré, est brun avec des bandes rougeâtres & des taches brunes, les côtés sont garnis de poils courts & roides; les Etais festonnés, sont traversés des jointures aux extrémités, par une grosse veine, qui avec les autres petites veines transversales, donnent à ces Etais l'air d'une feuille sèche; les Ailes sont d'une couleur de pourpre bruns, les pieds sont bruns, les Pattes antérieures longs, larges & armés, en dedans, de fortes épines. Elle est de Suriname.

Fig. 15. LE NAIN DE COROMANDEL.

Du Genre des Mantes,
(De la premiere Famille.)

A de courtes Antennes brunes, filiformes; la Tête est ainsi que tout le corps & les pieds d'un rouge brun, les Pattes antérieures sont garnis d'épines, les Ailes & les Etais d'un jaune terni, ceux-ci ont, vers le milieu du bord extérieur une raye d'une rouge brunâtre. Il ressemble beaucoup, à la couleur près, à la Fig. 3. de la Pl. I. & à la Fig. 6. de la II^e Planche. Il se trouve à la côte de Coromandel.

PLAAT

19



10'



17



18



P L A A T V.

P L A N C H E V.

Fig. 16. HET GESTREEPTE WANDELENDE BLAD MET SMALLE DEKSCHILDEN.

Fig. 16. LA MANTE RAÏÉE À ETUIS ÉTROITS.

(Van 't Tweede Gezin.)

(De la seconde Famille.)

De Sprieten zyn lang en draadvormig, de Kop en Oogen grys, het Lyf bruingeel, en byna rond, op het Borststuk twee bruine overlangte streepen, de Pooten bruingeel, en de Vangpooten aan de binnenzijde met kort doornen bezet. De Dekschilden aan den buitenrand lederagtig en lichtgroen van kleur, het overige derzelven netswyze geadert en helder doorschynend. De Vleugels donker en bleek aschkleurig doorschynend aan de tippen bleekbruin en aan de buitenranden zwart gestipt. Zy woont in Surinamen, en berust nevens alle hier afgebeelden in het genoemde Kabinet.

Les Antennes sont longues & filiformes, la Tête & les Yeux gris, le Corps jaune brun & presque cylindrique; il y a sur le long du Corcelet deux rayes brunes; les pieds sont jaunes-brun & les Pattes antérieurs garnis en dedans de courtes épines; le bord extérieur des étuis est velineux & d'un verd clair; le reste veiné à réseau & fort transparent; les Ailes d'un cendré clair & sombre, les extrémités d'un brun clair & tachetées de noir aux bords extérieurs. Elle est de Suriname & se trouve avec toutes celles de cette planche dans le Cabinet mentionné ci-dessus.

Fig. 17. HET ROODGEVLEUGELDE SPOOK.

Fig. 17. LE SPECTRE à AILES ROUGES.

(Van 't Eerste Gezin.)

(De la première Famille.)

Heeft borstelagtige bruinroode Sprieten, de Kop, Lyf en Pooten bruinrood, de Oogen grys. De Dekschilden bruinrood met een donkerbruinen streep op 't midden: de buitenrand der Vleugels is lederagtig en vuil groenkleurig, het vliesagtig gedeelte derzelven heeft eene bleek fermiloenkleur en is weinig doorschynend. Zy is van het Molukksche Eiland Amboina.

A les Antennes soyeuses, d'un rouge-brun, la Tête le Corps & les Pieds d'un rouge-brun, les Yeux gris; les Etuis rouge-brun, sont traversés d'une raye d'un brun foncé; les bords extérieurs des Ailes sont velineux & d'un verd sale, la partie membraneuse, qui est peu transparente, à une légère teinte de vermillon. Il est d'Amboine, Isle Moluque.

Fig.

Fig. 18. HET DRAAKJE.

Van 't Geslacht der Spooken en 't Tweede Gezin.

De zeltzaame gedaante van dit Insect doet er my den Naam van *Draakje* aangeeven. Het heeft de Sprieten bors-telagtig, den Kop aschkleurig, de Nypers aan den mond zwart en is met vier bruine Baardsprietjes aan denzelven voorzien: de Oogen zyn bruin. Het Lyf en de Pooten bruin, de Schenkels breed en nevens de Scheenbeenen der Agterpooten met zwarte doornen gewapent. Het Borststuk is met verheven witte stippen bezet en aan de zyden met twee tandswyze uitsnydingen. Dit Spook nog in den staat van Nymph zynde, dewyl hetzelve de Dekschilden en Vleugels in de stompjes of Vleugelscheeden beslooten heeft, zo moest het nog eerst de laatste verhuidinge hebben ondergaan, bevoorens het den volmaaktten staat zou bereikt en de volwassen Vleugels bekomen hebben.

Uit de gedaante van dit Insect blykt dat de kenmerken welke wy by het tweede Gezin der Spooken, hebben bepaalt, namelyk, dat de voorste Pooten korter zyn dan de agtersten, en het Lyf in 't algemeen meer plat en niet rolrond is, dan die van 't eerste Gezin, (Fig. 17.) 't welk nader zal blyken by de afbeeldingen van meerder soorten welke hier by behooren. Ik heb deze van de Noordoost Kust van het Eiland Java; van *Samarang* ontfangen.

Fig. 18. LE PETIT DRAGON.

Du Genre des Spectres. (De la seconde Famille.)

C'est la singuliere figure de cet Insecte qui m'engage à le nommer le petit Dragon. Il a les Antennes soyeuses, la Tête d'une couleur cendrée, la Bouches dont les Mandibules ou pinces, sont noires, est pourvue de quatre Antennules brunes: les Yeux sont bruns, ainsi que le Corps & les Pieds, les Cuisses, larges, sont armées d'épines noires, ainsi que les Jambes des pieds postérieurs. Le Corcelet, parsemé de points saillans blancs, sur les côtés deux échancrures dentelées. Ce Spectre est encore dans l'état de Nymph; les Etais & les Ailes étant encore renfermé dans les boutons ou fourreaux il restoit à subir une dernière dépouille pour atteindre à son état parfait, & au développement des Ailes.

La forme de cet Insecte prouve que les Caractères que nous avons assignés à la seconde famille des Spectres, savoir, les Pieds antérieurs plus courts que les postérieurs, & le corps en général moins cylindrique & plus applatti que ceux de la première Famille (Fig. 17.) forme entre les deux familles de ce Genre une distinction marquée, qui se confirmera encore par la représentation de plusieurs autres sortes qui appartiennent à celle-ci. J'ai reçu cet Insecte de Samarang, à la côte Nord-est de l'Isle de Java.

Fig.



Fig. 19. HET GROEN GERANDE WANDELENDE BLAD.

Fig. 19. LA MANTE BORDÉE DE VERD.

Van 't Eerste Gezin.

(De la première Famille.)

Heeft zwarte lange draadvormige Sprieten, de Kop en de groote uitpuilende Oogen bleekgroen, het Borststuk in 't midden verheven en van dezelve kleur, de randen van 't zelve vuilgeel, het Agterlyf breed en geelagtig, de Pooten bruinagtig groen; de Vangpooten dik, breed en aan de onder zyde fcherp gedoornt.

De Dekschilden en Vleugels hebben de buitenranden bleekgroen en lederagtig, voor 't overige wit, glasagtig en helder doorschynend, zy heeft eenige overeenkomst met de door den Heer DE GEER afgebeelde, *Glas Vleugel*, (*) *Mantis Hyalina*, doch onderscheid zig wegens de groene lederagtige randen der evengemelde Dekschilden en Vleugels, weshalve ik deze voor eene byzondere soort houde. Men vind ze in *Surinamen*.

Cet Insecte a de longues antennes noires & filiformes, la Tête & les gros yeux saillans d'un verd tendre, le corselet de la même couleur vers le milieu, qui est relevé, est d'un jaune sale vers les bords, l'abdomen large & jaunâtre, les pieds d'un verd brunâtre, les bras, ou pinces, grosses larges & fort garnier d'épines à l'inférieur.

Le bord extérieur des étuis & des ailes est velineux & d'un verd pâle, le reste en est blanc, vitreux & fort transparent. Elle a quelque rapport avec l'aile vitreuse (MANTIS HYALINA) dépeinte par Monsieur DE GEER, () mais s'en distingue par les bords velineux verds des étuis & des ailes, ce qui me la fait juger d'une espèce différente. Elle se trouve à Suriname.*

(*) DE GEER ins. Tom. III. pag. 266. no. 4. Tab. 37. fig. 1.

P L A A T VI.

P L A N C H E VI.

Fig. 20. HET GROENE SPOOK.
(Wyf.)Fig. 20. LE SPECTRE VERD.
(Femele.)(van 't 1^{ste} Gezin.)(de la 1^{re} Famille.)

In grootte heeft deze veele overeenkomst met Fig. 1. op Pl. I. doch de kleur en de kleine Vleugels doen ze te veel van elkander onderscheiden.

Celui-ci a beaucoup de rapport pour la taille avec Fig. 1. Pl. I. mais il en diffère trop, par la couleur & de plus petites ailes pour les confondre.

D

De

De Sprieten zyn borstelvormig, de Kop is groot, ovaal rond en geelagtig groen, de mond is voorzien met vier Baardsprietjes, van welke de twee bovenste de lengte van vier lynen hebben: de Netswyze Oogen zyn glanzig en bruinrood van kleur. De drie kleine blinkende Oogjes kan men naauwlyks door een maatig vergrootglas ontdekken. Het Borststuk en Agterlyf is hier in de afbeelding bruin, doch meestal vind men deze Insecten bleekgroenkleurig, welke kleur egter door de tydt in donker of lichtbruin en bruinagtig geel verandert, naar maate dezelve oud, lang bezwaard of wel in Liquor zyn overgezonden. De Schenkels der Pooten zyn breed en aan de onderzyde met korte doornen bezet, doch de Scheenbeenen ongedoornt, het laatste of vyfde lid der Voeten eindigt in een tweevoudigen scherpen klaauw. De lederagtige Dekschilden zyn kort, bladvormig rond, en sterk geadert; de buitenranden der Vleugels hebben, evengelyk de Dekschilden, eene groene kleur en zyn lederagtig, doch het overige gedeelte derzelven is dun en doorschynend, in de meesten wit, egter hebben zommige dit vliesagtige gedeelte der Vleugels bleek roozenrood. De Leg waarmede de Wyfjes hunne Eyeren in de Aarde brengen, is als tuschen twee tegen elkander geplaatste Scheden beslooten en word bewaard door een Lid 't welk de gedaante van een zaamgevouwen blad heeft, dat aan den elfden Ring op de onderzyde van 't Agterlyf zyn begin neemt. Deze Insecten worden op de Molukksche

Les antennes sont Soïenses, la Tête grande, ovale & d'un verd jaunâtre; la Bouche est pourvue de quatre antennules dont les deux supérieurs ont quatre lignes de longueur: Les Yeux à réseau sont luisant & d'un rouge brun, les trois petits Yeux lisse se distinguent à peine par une louppe moïenne. Le Corcelet & l'abdomen sont ici représentés brun, quoique d'ordinaire on trouve cet Insecte d'un verd pâle, mais cette couleur se change avec le tems en brun foncé ou en brun clair & jaune brunâtre, selon que ces Insectes ont vieilli dans les collections ou qu'ils ont été transportés en liqueurs. Les cuisses sont larges & garnies, en dessous de courtes épines; mais les jambes sont sans épines. La cinquième articulation des tarses se termine en une double griffe aigue. Les Etais velineux des ailes sont courts ronds, foliformes & fort veinés; les bords extérieur des ailes sont verds, ainsi que les Etais, & velineux; mais le reste en est mince & transparent; blanche par la plupart, quelques un cependant ont la partie membraneuse des ailes d'une couleur de rose pâle, la Tarrière, qui sert aux Femelles pour poser leurs œufs en terre, est comme renfermée entre deux fourreaux opposés, & est deffendue par une membrane, en forme de feuille pliée, qui sort de l'onzième anneau à la partie inférieure de l'abdomen. Ces Insectes se trouvent aux Isles Moluques, Ternate, Amboine & Banda: à la côte de Guinée en Afrique & dans l'Amérique espagnole.

Eylanden *Ternaten*, *Amboina* en *Banda* als mede op de *Africaansche Kust* van *Guiné* en ook in de *Spaansche Westindien* gevonden.

HOUTTUIN *Natuurk. Hist.* I Deels 10 St. pag. 137. Pl. 79. Fig. 1.

Fig. 21. HET GROENE SPOOK.
(Man.)

(van 't 1^{ste} Gezin.)

Heeft de Sprieten aan den wortel dikker dan naar de einden alwaar dezelve zeer dun en als draadvormig zyn, de Kop is bruingroen, de Oogen blinkend en bruinrood, het Borststuk donkergroen en met verheven pukkels bezet aan de bovenzyde. Het Agterlyf bruingeel, egter kan deze kleur, niet bepaalt worden alzo waarfchynelyk hunne natuurlyke kleur, in leven zynde, groen is, en de groene kleur verandert in deze als in andere Insecten van deze Classe, na hunnen Dood, gemeenlyk in bruin of bruinagtig geel. Het blaadje waarin het mannelyk Teelid is beslooten, neemt deszelvs begin niet, gelyk aan 't wyfje, aan de onderzyde van 't Agterlyf aan den elfden Ring, maar op de bovenzyde van denzelven en maakt dierhalven hierin juist het tegenovergestelde met de andere Sexe. En dat deze twee hier afgebeelde Insecten tot een en dezelve soort behooren blykt, doordien my uit *Amboina* een vles met deze Dieren in Liqueur is toegezonden, waarin een paar derzelven nog gepaart en op elkander zittende wierden gevonden,

Fig. 21. LE SPECTRE VERD
(Mâle.)

(de la 1^{re}. Famille.)

A les Antennes plus grosses à la racine que vers les extrémités où elles sont très déliées & comme filiformes; la Tête est d'un brun, les Yeux sont lisses & d'un brun rougeatre; le Corcelet d'un verd foncé est, en dessus, parsemé de petites pustules: l'abdomen est d'un jaune brun; mais on ne sauroit déterminer absolument cette couleur, le verd étant probablement la couleur naturelle de cet Insecte pendant la vie; apres la mort le verd se change chez ceux-ci comme chez d'autres de cette classe, soit en brun, soit en jaune brunatre. La folicule qui renferme l'organe générique du mâle n'est pas placée comme chez la femelle à la partie inférieure de l'abdomen, à l'onzième anneau; mais au dessus, ce qui est l'opposée de l'autre sexe. Il n'en est pas moins certain, que ces deux Insectes ci sont de la même espèce puisque dans une bouteille de ces animaux sur ligneur, qui m'a été envoyée d'amboine, il s'en est trouvé deux qui étoient encore accouplés, de sorte que la mort même n'avoit pu les séparer; une collection de cette ville, (celle de Monsieur ANTH. DE RENSSELAAR.) fournit encore un exemple pareil. Les Etuis sont courts, ronds, foliformes, veinés, &, comme le bord des ailes, veliculés

zulks de Dood hun niet had kunnen scheiden; Er is daarvan nog een voorbeeld in de verzameling van den Wel Ed. Heere ANTH. VAN RENSSELAAR Wz. alhier in deze Stads te vinden.

De Dekschilden zyn kort, rond, bladvormig geadert en nevens de buitentanden der Vleugels lederagtig en van een schoone groene kleur, het vliesagtig gedeelte der Vleugelen is doorschynent en langer dan die van 't Wyfje, als bedekkende daarmee byna het geheele Agterlyf, de Pooten hebben dezelve gedaante als die der Wyfjes en zyn aan de onderzyde der Schenkels met korte doornen gewapent.

De Heer DRURY (*) geeft de afbeelding van een Spook 't welk zyn Ed. zegt, dat op 't Eyland Jamaika was gevonden, en dat veele overeenkomst met dit mannetje heeft, egter in veele opzigten, als in het gladde en ongepukkelt Borststuk, de dikte der Sprietten, de gedaante der twee laatste Ringen aan 't Agterlyf, merkelyk verschild, toch wat de kleur der Vleugels betreft en die daar bleekrood is, daarvan heb ik reets gezegd dat die in zommigen van deze soort ook, maar nimmer zo hoog rood, als zyn Ed. die in afbeelding geeft; worden gevonden veellicht is dezelve eene verscheidenheid en dan zou men daaruit mogen vermoeden dat deze Insecten ook in de Westindien huishouden.

(*) DRURY *ins.* Tom. II. pag. 88. Tab. 49. Fig. 1. *Mantis Jamaicensis.*

neux & d'un beau verd. Ces ailes, dont la partie membraneuse est transparente, sont plus longues que celles de la Femele & couvrent presque entierement l'abdomen; les pieds ont la même forme que ceux de la Femele & sont armés de courtes épines en dessous des cuisses.

Le Sieur DRURY () peint un spectre qu'il dit avoir été trouvé à la jamaïque, & qui a beaucoup de rapport avec ce mâle; mais il en diffère essentiellement à plusieurs égards; comme, par le Corselet uni & sans pustules, la grosseur des antennes & la forme des deux derniers anneaux de l'abdomen; quand à la couleur des ailes, qui dans celui là, est d'un rouge pâle, j'ai déjà dit qu'il s'en trouve quelques uns de cette espèce dont les ailes sont d'un rose pâle; mais jamais elles ne sont d'un rouge aussi décidé que dans cette figure, peut-être en est-ce une variété, & l'on en pourroit conclure que cet Insecte se trouve aussi aux indes occidentales.*

Fig. 22. HET GEEL VLEUGELIG
WANDELEND BLAD.(van 't 1^{ste} Gezin.)

Dit Wandelend blad heeft den Kop, het Borststuk en de Vangpooten vuil wit met zwarte streepjes en geelagtige vlakken; de Dekschilden donkergeel met een bruine ronde vlak op 't midden; de Vleugels zyn geel, het Agterlyf is donkerbruin met bruingeel vlakken, doch aan de vier laatste Ringen grys met zwart gevlaakt. De middelste en agterste Pooten lichtbruin, de voorste of Vangpooten aan de Schenkels en Scheenbeenen dik en breed en aan de binnenzijde scherp gedoornd. De Oogen zyn bruin en uitpuilend, het Borststuk is breed, op 't midden verheven en aan de zyden met een verheven rand. Het blykt dat dit Insect nog in den staat van Nymph is, wegens de korte Dekschilden en Vleugels, 'er is my nog geene volwasfen van deze soort voorgekomen, weshalven ik dezelve in den Staat waarin ze was heb doen afbeelden. Zy is op de Kust van Coromandel naby Nagapatnam gevonden, en berust nevens de voorgaande en de naastvolgende in het Kabinet van den Heere L. F. HOLTHUISEN.

Fig. 23. HET BRUINE GROOTGEOOGDE
WANDELENDE BLAD.(van 't 1^{ste} Gezin.)

Heeft dunne draadvormige Sprieten, een groote Kop de Oogen verre uitpuil-

Fig. 22. LA MANTE AUX AÎLES
JAUNES.(De la 1^{re}. Famille.)

Cette Manti a la Tête, le Corselet & les Pattes antérieures, d'un blanc sale, raie de noir avec des taches jaunâtres; les Étais, d'un jaune foncé, ont sur le milieu, une tache ronde brune; les aîles sont jaunes, l'abdomen, d'un brun obscur, à des taches d'un jaune brunâtre; les quatre derniers anneaux sont gris, tacheté de noir; les pieds du milieu & les postérieurs brun clair, les antérieurs ou Bras sont gros & larges, tout aux jambes qu'aux cuisses, fort garnier de épines. Les Yeux sont brun & saillans; le Corselet est large & relevé sur le milieu avec un rebord sur les côtés. Cet Insecte paroît, vu la petitesse des étuis & des aîles, être encore dans son état de Nymphé, mais comme je n'en ai pas encore rencontré de cette espèce, dans l'état de perfection, je l'ai fait graver tel qu'il étoit. Elle vient de la côte de Coromandel, pres de Negapatnam & se trouve, ainsi que la précédente & celle qui suit, dans la collection de Monsieur L. F. HOLTHUISEN.

Fig. 23. LA MANTE BRUNE-AUX-
GROS-YEUX.(de la 1^{re}. Famille.)

A les Antennes filiformes, la Tête grosse, & les Yeux sort saillans & très

lende en zeer groot in vergelykinge van anderen in deze Classe behorende Insecten. Het Borststuk is breed, plat, doch met een verheven rand, het Agterlyf is vooraan smal en in 't midden en naar 't einde breed, de Dekschilden zyn niet lederagtig, maar gelyk de Vleugels bruingeel met donkerbruin geschadwt en doorschynend. De Vangpooten zyn zeer breed en aan de binnenranden der Scheenbeenen als mede de in een scherpen klaauw eindigende voeten met sterke doornen bezet. Het geheele Insect is donker en geelagtig bruin met donderbruine vlakken zo wel op 't Borststuk als aan de Pooten getekent. Men heeft ze op de kust *Coromandel* gevonden.

grands, en comparaison d'autres Insectes de cette classe. Le Corselet est large & plat; mais à bord relevé, l'abdomen, d'abord étroit, s'élargit vers le milieu & jusqu'à l'extrémité; les Etais ne sont pas velineux, mais comme les ailes, d'un jaune brun ombré de foncé, & transparents. Les Pattes antérieures sont très larges & garnies de fortes épines; aux bords inférieurs ainsi que les pieds qui se terminent en une griffe aigue. L'Insecte entier est d'un gros brun jaunâtre, marqué de taches d'un brun obscur, tant au Corselet qu'aux pieds. Elle a été trouvée à la côte de Coromandel.



B



A



C



25

Fig. 24. HET CITROENBLAD.
(Man.)*Van 't Geslagt der Spooken.**(van 't 2^{de}. Gezin.)*

Deze is het Mannetje van de volgende Fig. 25 en 26. De Sprieten zyn borstelagtig, en bestaan uit langwerpige ronde leeden, de Kop is Eirond, de Oogen een weinig uitpuilende en blinkend donkergeel; de Mond is met twee zwarte Nypers of Kaakbeenen voorzien. Het voorste gedeelte van het Borststuk is klein, hartvormig en aan 't zelve zyn de twee voorste Pooten geplaatst; het tweede gedeelte is langwerpig, en ter zyden met kleine doornen bezet, aan 't einde van 't zelve zyn de Dekschilden en Vleugels geplaatst. Het Agterlyf is plat en van eene groene vliezige, bladragtige gedaante.

De Dekschilden zyn kort, lederagtig, groen van kleur en bladvormig, van boven ruw en in 't midden met eene sterke doorloopende Ader voorzien: de Vleugels hebben geen lederagtigen buitenrand, maar zyn aldaar een weinig groenkleurig, doch gelyk het overige gedeelte derzelven, netswyze en doorschynend. De Schenkels der voorste Pooten hebben wederzyds een breed bladerig Vlies, 't welk aan de voorzyde tandswyze is uitgesneden, aan de beenen ziet men mede een dergelyk doch smalder vlies dan aan de

Fig. 24. LA FEUILLE DE CITRON.
(Mâle.)*Du Genre des Spectres.**(de la 2^{me}. Famille.)*

Il est le Mâle des Fig. suivantes 25 & 26. Les Antennes sont soyeuses & consistent en longs articles ronds, la Tête est ovale, les Yeux saillans & lisses, d'un jaune foncé; la bouche munie de deux mâchoires noires. La partie antérieure du Corcelet en forme du cœur, où sont placées les deux pattes antérieures, est petite, la seconde partie est longue & des deux côtés est garnie de petites épines, à l'extrémité de cette partie sont placés les Elytres où Etais & les Ailes. L'Abdomen est plat, velineux, couleur d'olive, en forme de feuille, raboteux par dessus & dans le milieu pourvu d'une veine forte, qui le traverse en longueur. Les Ailes n'ont point de bords extérieurs velineux, mais à ces extrémités sont un peu vertes; cependant, comme le reste de l'aile, à réseau & transparentes. Les cuisses des pattes antérieures ont de chaque côté une large membrane feuillée, qui par devant est dentée, on voit aussi de pareilles membranes aux jambes, en dessous, mais plus étroites qu'aux cuisses. Les Pattes mitoyennes & postérieures sont aussi feuillées mais non si largement que les antérieures; les jambes sont sans membranes & épines; les tarses consistent en cinq articles.

BESCHRYVING

Schenkels : de Midden- en Agterpooten zyn ook bladerig, maar niet zo breed dan de voorsten, de Beenen egter ongevliest en zonder doornen; de Voeten bestaan uit vyf leden.

De Heer L. F. HOLTHUISEN heeft deze uit het Molukksche Eiland *Amboina* ontvangen.

Fig. 25 en 26. HET CITROENBLAD.
(Wyf.)

Ik houde deze voor het Wyfje van de voorgaande, want ten opzichte der gedaante van het Borststuk, Lyf en Pooten hebben dezelve eene volmaakte overeenkomst, en onderscheiden zich maar, in 't uiterlyke, in de meerder groote Dekschilden. Fig. 25 A. verbeeld een klein onvolwassen, aan welken nog maar even de beginselen der scheden van de Dekschilden te zien, en welker Sprietten aan 't begin geknopt, en in dunne hairen eindigen, doch voor 't overige de gedaante van 't volmaakte Insect heeft. Fig. 25 B. is de afbeelding van een grooter, en Fig. 25 C. verbeeld dit Spook in den staat van Nymph voor de laatste verhuizing, als wanneer dezelve de Dekschilden bekomen en hunnen volmaakten staat berykt hebben; waarvan Fig. 26: een zulk naauwkeurig denkbeeld opleevert, dat het geene breedvoerige Beschryving behoeft: alleen zal ik hier maar byvoegen, dat de Dekschilden byna het geheele Agterlyf bedekken en wegens de daar doorlopende Aderen de gedaante van Citroenbladen hebben. De Vleugels ontbreeken aan deze

DESCRIPTION

Mr. L. F. HOLTHUISEN a reçu cette espece d'Amboine l'une des Iles Moluques.

Fig. 26 & 27. LA FEUILLE DE
CITRON. (Femelle.)

J'estime celles-là pour être les Femelles de la précédente; car à l'égard de la forme du Corcelet, Corps & Pattes, elles ont une parfaite connexion & ne diffèrent guères que dans l'Extérieur & plus de Grandeur aux Elytres ou Etuis. La Fig. 25. A. représente une petite Larve à laquelle on commence à voir les fourreaux des Etuis, dont les Antennes sont au commencement nouées & se terminent en fili-formes très fins; mais pour le reste a l'a forme de l'Insecte parfait. Fig. 25 B. est la représentation de ce Spectre en Nympe, avant d'avoir la dernière peau, comme lorsqu'elles ont acquis leurs Etuis, & perfection, dont la Fig. 26. fournit une idée juste & exacte, sans une plus ample description. J'ajouterai seulement ici, que les étuis couvrent presque tout l'Arrière Corps & ont la forme de feuilles de Citron, à cause des veines qui les traversent, ces femelles sont en défaut du côté des Ailes, au contraire les mâles, à Fig. 24. en sont richement pourvus.

La partie de derrière du Corps est large, membraneuse, plate & transparente, & l'on pourroit presque dire que dans les
Wyf-

Wyfjes, daarin tegendeel de Mannetjes, by Fig. 24. grootelyks daarmede zyn voorzien. Het Agterlyf is breed, vliezig, plat en doorschynend, en men zou zeggen dat in 't midden van 't zelve maar een eenige Canaal of Darm loopt, even als in die zoorten der Springhaanen, welke men *Ledige* noemt, en door den Heer Profefiør THUNBERG in *Act. Holm.* 1775. pag. 256. tab. 7. fig. 1, 2, 3. onder de benaaming van *Pneumora* zyn beschreeven.

De Pooten zyn eveneens als die van 't Mannetje, doch ten aanzien der grootte van 't Insect, zeer dun, en de breedte derzelven word alleen veroorzaakt, door middel der Vliezen, waarmede alle de Schenkels en de Beenen der Voorpooten zyn bezet.

Aangaande de Kleur, dan zyn deze Insecten, ten minsten in de gedroogden, zeer onderscheiden, meestal vind men dezelve van eene vuilgeele kleur en maar zeer zelden geheel groene, gelijk Fig. 24. Ik heb de Kleuren gevolgt naar een voorwerp uit het Kabinet van den Heer L. F. HOLTHUIZEN, 't welk onder meer anderen uit het Eiland *Amboina* was gezonden.

Milieu, il n'y a qu'un seul Canal où Boyau qui traverse son Milieu, comme dans l'Espèce des Sauterelles, qu'on nomme Vesiculeux, & décrites par le Professeur THUNBERG dans l'Act. Holm. 1775. pag. 256. table 7. fig. 1, 2, 3. sous la Dénomination de Pneumora.

Les Pattes sont semblables à celles du Mâle; cependant, rapport à la Grandeur de cet Insecte, très minces, & leur largeur n'est occasionnée que par le moyen des membranes, dont toutes les Cuisses & Jambes des Pattes antérieures sont fournies.

Quant à la Couleur, ces Insectes sont très différens, au moins quand ils ont cessé de vivre. On les trouve pour la plupart d'un jaune sale, & ce n'est que rarement qu'on les trouve entièrement verts, comme la Fig. 24. J'ai suivi la Couleur d'après un objet, tiré du Cabinet de Mr. L. F. HOLTHUIZEN, qui avoit été envoyé, parmi beaucoup d'autres, de l'Île d'Amboine.

LINN. *Syst. Nat.* pag. 689. n. 3. *Mant. Siccifolia.* FARRICIUS *Sp. inf.* 1. pag. 347. n. 14. *idem.* *Mantissa insect.* 1. pag. 228. n. 16. RÖSEL, *inf.* 2. *Gryll.* tab. 17. fig. 4. 5. HOUTTUIN *Nat. Hist.* I. D. 10 St. pag. 141. tab. 79. fig. 2. GOEZE *Entom. Beyträge.* Tom. 2. pag. 21. n. 3.

Fig. 26. HET BONTE SPOOK.

(van 't 1^{ste}. Gezin.)

De Sprieten van deze Spook zyn kort en niet dikker als dunne haren; de Kop, Borststuk en de Pooten bruin, het Agterlyf bruinrood; de Dekschilden kort, bruin en met witte streepjes, de buitenranden der Vleugels zyn lederagtig, bruin en ieder met vier geele langwerpige vlakken, het midden dezer Vleugels is wit, en voor 't overige bruin, vliesagtig en met eenen paarschkleurigen weerschyn. Op de onderzyde is het Lyf aschkleurig.

Zy wonen in Surinamen, en is my door den Heer M. HOUTTUIN, Med. Doct., ter afbeelding medegedeelt, doch dezelfde berust thans in het Kabinet van den Heer L. F. HOLTHUISEN.

Fig. 27. DE BRUINE TWEEDOORN.

Van het Geslacht der Spooken.(van 't 2^{de} Gezin.)

Deze Spook heeft lange borstelagtige Sprieten, en is, over 't geheel genomen, bruin omberkleurig; het Borststuk heeft, van boven, kleine verheven pukkels, en ieder zyde van den tweeden Ring, naby de gewrigten der korte Dekschilden, met een scherpen Doorn gewapend: De Vleugels zyn bruin, doorschynend en met don-

Fig. 26. LE SPECTRE MARQUETÉ.

(de la 1^{re}. Famille.)

Les Antennes de ce Spectre sont courtes & comme de minces cheveux, la Tête, Corcelet, & les Pattes bruns, l'arrière partie du corps d'un brun rougeâtre; les Etuis courts, bruns avec des rayes blanches, les bords extérieurs des Ailes sont velineux, bruns & à chacun quatre taches jaunes longitudinales, le milieu des Ailes est blanc, pour le reste brun, membraneux, avec un reluisant couleur violette, la partie de dessous le corps est couleur de cendres.

Ils habitent à Surinam, & m'ont été communiqués, pour en tirer la représentation par Mr. HOUTTUIN, Docteur en Médecine; cette espèce est cependant dans le Cabinet de Mr. L. F. HOLTHUISEN.

Fig. 27. LE DOUBLE-EPINE BRUN.

Du Genre des Spectres.

(de la 2^{de}. Famille.)

Ce Spectre a les Antennes longues & soyeuses, il est, généralement pris, brun couleur d'ombre, le Corcelet a en haut des petites bossettes élevées, & chaque côté des deux anneaux, tout près des jointures des courts étuis, armé d'une épine aiguë, les Ailes sont brunes transparentes, & marquées de taches de brun foncé; le dessous du corps est gris.

ker-



kerbruine vlakken getekent. Op de onderzyde is het Lyf grys van kleur.

Men vind ze in *Surinamen*. en berust hier in de laatstgenoemde Verzameling.

Fig. 28. DE PURPERE WEERSCHYN.

Van 't Geslacht der Wandelende Bladen.

(van 't 2^{de}. Gezin.)

Wegens de gedaante heeft dit Wandelend blad veele overeenkomst met Fig. 9. op de voorgige IIIde. Plaat, en men zou dezelve ook even als die op het eerste gezigt voor een Spook houden; maar de gestalte van den Kop en de Vangpooten wyzen genoegzaam aan, het Geslacht waaronder zy behoort. De Kop is driehoekig, de sprieten lang en zeer dun, de Oogen uitpuilende en aschkleurig; het Lyf is zeer smal, rolrond en gelyk de Pooten bruin. De Voorpooten eindigen in eenen scherpen klaauw, waaraan de kraalswyze vyfledige voet gehegt is; de beenen hebben onderwaards eenige scherpe doornen. De Dekschilden zyn nevens den buitenrand der Vleugels omberkleurig en lederagtig, het overige gedeelte der Vleugels is netswyze doorschynend en ieder met vier donkerblauwe vlakken gefiert, de ploojen derzelven hebben ook eene blauwe kleur, maar die verandert in bruinagtig purper, naar maate het licht daarop valt.

Haar Vaderland is *Surinamen*, en berust in het Kabinet van den Hoog Welgeb. Heere. RAYE VAN BREUKELER-WAERTH.

On trouve cette Espèce à Surinam & est dans la Collection susmentionnée, de Mr. L. F. HOLTHUISEN.

Fig. 28. LE RELUISANT POURPRE.

Du Genre des Mantès.

(de la 2^{me}. Famille)

Quant à la forme, cette Mante a beaucoup de rapport avec la Fig. 9. sur la précédente Planch. III. & à la première vue, l'on seroit tenté de la prendre pour un Spectre; mais la forme de sa tête & des Griffes désigne suffisamment dans quel Genre elle appartient. La Tête est triangulaire, les Antennes très-minces, les Yeux saillans, & couleur de cendres. Le Corps est fort étroit, parfaitement rond & brun de même que les Pattes. Les Pattes antérieures se terminent en Griffes aiguës, où la patte, à cinq articles en manière de grains enfilés est attaché. Les Jambes ont par dessous des épines aiguës; Les Etais, ainsi que les Ailes aux bords extérieurs, sont velineux & couleur d'ombre; le reste de la partie des Ailes est transparent à réseau chacune ornée de quatre taches de bleu foncé; les plis des Ailes ont aussi une couleur bleue, mais se changent en pourpre brunâtre, à mesure que le Lumière réfléchit dessus.

Leur Patrie est Surinam, & est dans le Cabinet de Mr. RAYE DE BREUKELER-WAERTH.

66 B E S C H R Y V I N G

Fig. 29. DE TWEEVLAKE.

Van het Geslacht der Spooken.

(van 't 1^{ste}. Gezin.)

Dit Spookje heeft lange dunne Spric-
ten, de Kop is eirond en nevens het Lyf
lichtbruin, de Pooten hebben dezelve
kleur, doch aan de gewrigten en voe-
ten derzelven, zwart; de Dekschilden
zyn aschkleurig en in 't midden met
eenen langwerpigen rondten geelen vlak
geteekent, de buitenrand der Vleugels
is lederagtig, aan de gewrigten wit
en naar de tippen aschgrauw, voor 't
overige, in 't midden donkergeel en
vuilwit naar de agterranden, geadert
en doorschynend.

Men vind ze op de Kust van Coro-
mandel te Tranquebar, en berust in het
evengenoemde Kabinet.

Fig. 30. DE KWABPOOT.

Van het Geslacht der Wandelende Bladen.

(Van 't 1^{ste}. Gezin.)

Dit Wandelend Blad heeft eenige
overeenkomst met de Fig. 34, 35 en
40. op de IX en X Plaat, doch de ge-
daante der Midden- en Agterpooten is
zeer onderscheiden, niet alleen met de
laatstgemelde, maar ook nog met eene
andere soort welke door den Ridder
LINNÆUS onder den naam van *Mant.*
Gongylodes is beschreven en waarvan ik
de afbeelding op de volgende XVIde
Plaat zal geven.

D E S C R I P T I O N

Fig. 29. LA DOUBLE TACHE.

Du Genre des Spectres.

(de la 1^{re}. Famille.)

Ce petit Spectre a de longues & minces
Antennes, la tête est ovale & de même
que le Corps est d'un brun clair, les Pattes
ont la même couleur; cependant aux join-
tures & aux tarses, noir. Les Etais sont
couleur de cendres, & au milieu marqués
d'une tache jaune longitudinale ronde, le bord
extérieur des Ailes est vélineux, aux join-
tures blanches, sur les pointes couleur de
cendres; pour le reste dans le milieu d'un
jaune foncé, le bord par derrière d'un blanc
sûle, veinées & transparentes. On le
trouve à Tranquebar sur la côte de Coro-
mandel, est dans le Cabinet, qu'on vient
de nommer.

Fig. 30. LE PIÉ LOBATIQUE.

Du Genre des Mantes.

(de la 1^{re}. Famille.)

Cette Mante a quelque rapport avec les
Fig. 34, 35 & 40. aux Planches IX
& X. cependant la forme du milieu & les
Pattes postérieures sont très différentes, non
seulement avec ces dites dernières; mais
encore avec une autre sorte, que le cheva-
lier LINNÆ a décrite sous le nom de Mante
Gongylodes, & dont je donnerai la figure
à la Planche XVI. suivante.

Celle-ci à la Tête grosse, triangulaire,
& sur le derrière de la Tête, entre les
Deze

Deze heeft den Kop groot, driehoekig en op het agtergedeelte van denzelven, tusfchen de Oogen een regt opwaards ftaande platte hoornagtige punt, welke egter in 't midden is gefpleeten, de Kaakbeenen of Nypers zyn groot en zwart; de Sprietten kort en als dunne fyne hairtjes, de Oogen groot en uitpuilend: het Borstftuk aan 't eerfte lidt hartvormig, agter smal, in 't midden gekield en de zyden met een verheven rand, het Agterlyf kort en byna rond. De Dekfchilden en Vleugels zyn wit met groen geftreept en hoornagtig doorfchynend, de voorfte of de eigentlyke Vangpooten zyn aan de fchenkels en beenen breed, en nevens den klaauw onderwaards zaagswyze getand: de overige Pooten hebben aan 't gewrigt der kniën wederzyds een plat bladeris vlies, en onder aan de Voeten twee fcherpe doornen, en 't is hier in, dat deze zig van de hier voorgemelde zoorten onderscheid, doordien dezelve, de Beenen glad, effen, zonder kwabben of doornen hebben. Waarfchynlyk is het Lyf en de Pooten van dit Infeët, in leven zynde, van eene meer groener kleur geweest, en men weet dat alle deze Schepzelen wanneer ze gedroogt zyn, en naar maate dezelve vogten hebben gehad, de eene meer en de andere minder, een geelagtige of bruine kleur aanneemen, weshalven ik my ook in 't afbeelden alleen bepaale naar die kleur welke de voorwerpen hebben, en niet daaromtrent willekeurig of naar eigen dunk handele; maar integendeel wegens de kenmerken der Leden en

Yeux un point plat en forme de corne, qui s'élève horizontalement, qui, cependant dans le milieu est fendu. Les Machoires sont grandes & noires; les Antennes courtes, comme de fins cheveux, les Yeux gros & saillans. Le Corcelet au premier article en forme de cœur, quillé étroit par derrière, dans le milieu, & les côtés avec un bord relevé, l'arrière corps presque rond. Les Etais & les Ailes sont rayés blanc & verd, comme en matière de corne, transparens. Les Pattes antérieures, proprement dit, les Serres, sont aux Cuisses & Jambes, avec les Griffes par dessous dentées en manière en Scie. Les autres Pattes ont aux jointures des Genoux de chaque Côté une membrane platte feuillée, & par dessous aux tarses deux épines aiguës, & c'est ici en quoi celle-ci diffère des autres sortes ci-mentionnées, en ce que ces mêmes ont les Jambes unies & sans épines. Vraisemblablement le Corps & les Piés de cette Insecte, étant en vie, ont été d'une couleur plus verte & l'on fait que toutes ces créatures, lorsqu'elles sont sechées & à mesure qu'elles ont contracté des humeurs, les unes plus, les autres moins, prennent une couleur jaunâtre ou brune; c'est pour quoi je me bor. e ici à rendre la couleur que ces objets ont, & non pas volontairement, suivant conjectures; & même j'apporte toute l'exactitude possible pour bien rendre les marques qui sont aux membres & à leurs parties.

J'ai reçu celle-ci de Tranquebar sur la côté de Coromandel, elle se trouve cependant dans la collection de Mr. L. F. HOLT-HUISEN.

Deelen alle mogelyke naauwkeurigheid doe in acht neemen.

Ik heb deze van *Tranquebar*, op de Kust van *Coromandel* ontvangen, doch dezelve berust nu in de verzameling van den Heer L. F. HOLTHUIZEN.

P L A A T IX.

Fig. 31. DE DIKBUIK.

Van 't Geslacht der Wandelende Bladen.

(van 't 1^{ste}. Gezin.

Heeft den Kop, Borststuk en 't Lyf zeer dik en breed, het Borststuk is aan de zyden getand, in 't midden gekield, de Vangpooten zyn breed en onderwaards scherp gedoord; de uit vyf leden bestaande kraalswyze voet, waarmede deze Insecten, wanneer ze den langen scherpen klaauw in hunnen gevangen prooi hebben geslaagen; denzelven als omwinden en omvatten, is langer en dikker dan gewoonlyk in anderen plaats heeft, waaruit blykt, dat dezelve groote Insecten kunnen vangen en tot hun voedsel gebruiken. De Dekschilden zyn voor het grootste gedeelte groen en lederagtig, doch naar den binnenrand een weinig doorschynend en met bruin gevlaakt; de Vleugels hebben den buitenrand mede lederagtig, aan de tippen bruin, maar voor het overige vliesagtig, netswyze en doorschynend.

Het is een Wyfje, 't welk my nevens de volgende van Fig. 32. in een fles met *Kildirel* opgevuld, uit Suri-

P L A N C H E IX.

Fig. 31. LE GROS VENTRE.

Du Genre des Mantès.

(de la 1^{re}. Famille.)

Il a la Tête, le Corcelet & le Corps très gros & large, le Corcelet est denté sur les côtés, quillé dans le milieu; les serres sont larges & par dessous munies d'épines aiguës, la Tarse, consistant en cinq articles, en grains enfilés, avec laquelle ces Insectes enveloppent & saisissent leur proie, lorsqu'ils y ont jeté leurs Griffes longues & tranchantes, est plus longue & plus grosse, qu'elle ne l'est ordinairement dans les autres espèces, d'où il est évident qu'ils peuvent prendre de gros Insectes, dont ils se nourrissent. Les Etais sont pour la plupart verts & vélineux, cependant du côté du bord intérieur, un peu transparens & mouchetés bruns. Les Ailes ont aussi le bord extérieur vélineux, brunes sur les pointes, mais pour le reste membraneuses, transparentes, & à réseau. Celle-ci, & la suivante Fig. 32, qui m'a été envoyée de Surinam dans une bouteille remplie de Rum, est une Femelle, présentement cette même est dans le Cabinet de Mr. L. F. HOLTHUIZEN.

Mantès

31



32



33



34



35



namen is toegezonden, thans berust dezelfde in het Kabinet van den Heer L. F. HOLTHUISEN.

Fig. 32. HET GEGORDELDE WANDELENDE BLAD.

(van 't 1^{ste} Gezin.)

Heeft lange dunne Sprieten, de Kop en Oogen, zyn benevens het geheele Lyfen de Pooten bruingeel; het Borststuk is op het midden gekield, aan de randen verheven en getand: het Agterlyf is met breede donkerbruine ringen in de gedaante van Gordels gesiert. De voorste Pooten met bruine vlakken en onderwaards scherp gedoornd, de Dekschilden hebben de gedaante van een Myrthenblad, zyn lederagtig en met bruin gevlakt; de Vleugels vuilgeel, op het midden en aan de tippen bruin met bruingeele aderen en doorschynend. Zy is uit Suriname en in de laatstgemelde Verzameling.

DRURY. ins. Tom. 2. Tab. 49. Fig. 2. Mant. Cingulata ex Jamaica.

Fig. 33. HET KLEINE GEHOORNDE WANDELENDE BLAD.

(van 't 1^{ste} Gezin.)

De Sprieten van dit Insect zyn bruingeel, de Kop is boven, tuschen de Oogen, in twee vooruitsteekende stompe punten verdeelt, waardoor zig zelfve als gehoornd vertoond, de Oogen zyn klein en weinig uitpuilende: het Borststuk is op 't midden verheven,

Fig. 32. LA MANTE CEINTURÉE.

(de la 1^{re} Famille.)

A les Antennes longues & minces, la Tête, les Yeux, de même que tout le Corps & les piés sont brun jaunâtre. Le Corcelet est quillé sur le milieu, élevé & denté sur les côtés l'abdomen est orné d'anneaux larges bruns-foncés en forme de ceinture, les piés de devant tachetés brun & par dessous ont des épines aiguës. Les Etuis ont la forme d'une feuille de Myrrhe, sont velineux & tachetés brun, les Ailes d'un jaune sale, brunes au milieu & sur les pointes, transparentes, & avec des veines brunes jaunâtres. Elle est de Surinam & dans la Collection, qu'on vient de citer.

Fig. 33. LA PETITE MANTE CORNUE.

(de la 1^{re} Famille.)

Les Antennes de cet Insecte sont brunes jaunâtres. La Tete en haut est, entre les Yeux, partagée en deux points émoussés, qui s'avancent, par ou elle se montre comme étant cornuë. Les Yeux sont petits & un peu Saillans. Le Corcelet en élevé sur le Milieu, plat sur les côtés &

F

aan

aan de randen plat en vliezig, waar door het zelve een hartvormige gedaante heeft. Het Agterlyf heeft ter zyden, aan den Ring een kwabbig uitsteekzel, waarvan ieder in eene punt eindigt, waardoor die rand zig als met zaagswyze tanden vertoont; de Dekschilden en Vleugels zyn bruingeel met donker bruine vlakken en doorschynend. De Voorpooten zyn dik en aan de onderzyde gedoornd, de middel en Agterpooten hebben ieder, naby het gewrigt van de Knie een vliesagtig blaadje. Deze schynt eene verscheidenheid te zyn van *Fig. 48.* op de hier volgende *XII^{de}. Plaat.* Zy woond aan de *Kaap de Goede Hoop* en berust in de verzaameling van den *Heer Profesfor N. Burmanus.*

Fig. 34. DE RUSSISCHE KAMSPRIET. (Man.)

Van 't Geslacht der Wandelende Bladen.

(van 't 1^{ste}. Gezin.)

De Sprieten van dit Wandelend blad zyn wederzyds kamvormig of gepluimd en groenagtig geelkleurig, welke zelvde kleur de gehoornde Kop, Borststuk, het Lyf en de Pooten ook hebben, de Oogen zyn bruinrood. Het Borststuk is aan 't begin vierhoekig en aan de zyden een stompen doorn, 't welk aan het Wyfje by *Fig. 35.* daar ter plaatze duidelyker is te zien. De Vangpooten hebben aan de beenen onderwaarts scherpe doornen en de overige Pooten aan de gewrigtten der Knien een hart-

membraneux, ce qui lui donne la forme d'un Cœur, l'abdomen a sur les cotés à chaque anneau un avancement glanduleux, dont chaque se termine en un point par ou les bords se présentent dentés comme une Scie, les Etais & les Ailes sont bruns jaunâtres, transparents, avec des taches brunes foncées. Les piés de devant sont gros & par des sous pourvus d'Epines, ceux du milieu & de derrière, ont chacun, près la jointure des Genoux, une feuille membraneuse. Celle-ci semble être différente de la Fig. 48. Sur la Planche XII^e suivante. Elle habite au Cap de bonne Espérance & est dans la Collection de Mr. Le Professeur N. BURMANS.

Fig. 34. LA MANTE AUX ANTENNES PECTINÉES DE LA RUSSIE (Mâle)

Du Genre des Mantes.

(& de la 1^{ste}. Famille)

Les Antennes de cette Mante, sont des deux côtés en forme de peigne ou plumassées de couleur jaune verdâtre, la Tête cornuë, le Corcelet, le Corps & les piés ont aussi cette même couleur. Les Yeux sont bruns rougeâtres. Le Corcelet est au commencement quarré, & à sur les côtés une épine émoussée, qu'à cette place on peut voir clairement à la Femelle Fig. 35. Les Serres ont aux jambes par des sous des épines aiguës, & les autres piés aux jointures des Genoux une membrane en forme de cœur. Les Etais & les Ailes
VOR-

vormig Vlies. De Dekschilden en Vleugels zyn aan de buitenranden schoon groen, voor 't overige wit en hoornagtig doorschynend. Deze is het mannetje van de volgende

Fig. 35. DE RUSSISCHE KAM-
SPRIET. (WYF.)

Is grooter dan het Mannetje en heeft zelfs de sprieten meerder gepluimd en de hoek aan de zyde van het Bortstuk is scherper gedoornd; het Agterlyf is ook dikker doch rond. De Dekschilden en vleugels zyn groen aan de randen, in 't midden vuilwit, maar de buitenranden en tippen der Vleugels bruingeel. Op het agterste van den Kop tuschen de bruine Oogen is een spits hoorn geplaatst, 't welk door een vergrootglas beschouwd in 't midden is gespleeten. Zy zyn in het Zuidelyk gedeelte van Rusland gevangen en de Heer Profesfor PALLAS heeft dezelve omtrent de Caspische Zee ontdekt.

De voorwerpen waarna deze afbeeldingen gemaakt zyn, berusten in het Kabinet van den Hoog Welgeb. Heere RAYE VAN BREUKELERWAERTH.

PALLAS Reizen. ausz. 2. Tb. Anb. no. 80. GOEZE. Entom. Beytr. Tom. 2. Pag. 13. n. 18.

P L A A T X.

Fig. 36. HET ZWARTE SURI-
NAAMSCH E SPOOK.

(van 't 1^{ste}. Gezin.)

Heeft de Sprieten, Kop, Oogen,

sont aux bords extérieurs d'un beau verd, pour le reste blanc, transparent & comme matière de corne. Celui-ci est le mâle de la Suivante.

Fig. 35. LA MANTE AUX ANTENNES
PECTINÉES DE RUSSIE (Femelle)

Est plus grosse que le Mâle, & a même les Antennes plus en peigne ou plumassées, & les coins aux cotés du Corcelet sont munis d'épines plus aiguës. L'abdomen est aussi plus gros; mais rond. Les Etais & les Ailes sont vertes sur les bords, d'un blanc sale au milieu, mais les bords extérieurs, les pointes des Ailes sont d'un brun jaunâtre. Sur le derrière de la Tête entre les Yeux bruns est placée une Corne pointuë qui, étant vuë avec une Loupe, est fenduë dans son Milieu on les prend dans la partie méridionale de Russie & Mr. Le Professeur PALLAS les a découvertes vers la Mer Caspienne. Les objets, d'après lesquels ceux-ci ont été tirés, sont dans le Cabinet de Mr. RAYE DE BREUCELERWAERTH.

P L A N C H E X.

Fig. 36. LE SPECTRE NOIR DE
SURINAM.

(de la 1^{re}. Famille.)

A les Antennes, la Tête, les Yeux,
F 2 he

het Borststuk, de Dekschilden en Pooten zwart; de agterste rand van 't Borststuk, de gewrigten der korte Dekschilden als mede het begin der Vleugels, is zwavelgeel. De buitenranden der Vleugels zyn lederagtig en voor 't overige zwart; het Agter lyf is aan beide zeiden bruin.

Men vind deze in *Surinamen* en berust nevens alle op deze *Plaat* afgebeelden in de verzameling van den Heer *L. F. Holthuisen*.

Fig. 37. DE ZWARTE COROMANDELSCH E SPOOK.

(van 't 2^{de} Gezin.)

Veel overeenkomst heeft deze met de naast voorgaande en is veelligt niet meer dan eene verscheidenheid der Sexe, want het voorwerp waarna deze is afgebeeld, een Mannetje en dat der *Fig. 36.* een Wyfje zynde, vind ik geen ander uitwendig onderscheid dan dat deze een geelagtigen band aan het begin van 't Borststuk heeft, en dat de geele kleur aan de Dekschilden en Vleugels niet zo schoon geel en het Lyf op de onderzyde aschkleurig is. Ik heb deeze onder meer andere Insecten van *Tranquebar* op de kust van *Coromandel* ontvangen.

Fig. 38. HET SMALLE GEHOORNDE WANDEL ENDE BLAD.

(van 't 2^{de} Gezin.)

De Kop van dit Insect heeft agterwaarts

le Corcelet, les Etais & piés, noirs. Les bords de derrière du Corcelet, les jointures des Etais courts, comme aussi le Commencement des Ailes sont de Couleur jaune de soufre. Les bords extérieurs des Ailes sont vélineux, & le reste noir. L'abdomen est des deux côtés brun.

On les Trouve à Surinam, & de même que celles, qui se trouvent représentées sur cette planche, sont dans la Collection de Mr. L. HOLTHUISEN.

Fig. 37. LE SPECTRE NOIR DE COROMANDEL.

(de la 1^{re} Famille.)

A beaucoup de rapport avec cette dernière; & il n'y a peut être pas d'autre différence que celle du Sexe; car l'objet, d'après le quel celui-ci est peint, étant un Mâle, & Celui de Fig. 36. une Femelle, je ne trouve point d'autre différence, sinon que celui-ci a un cordon jaunâtre au commencement du Corcelet, & que la couleur jaune aux Etais & Ailes n'est pas si belle qu'à la Femelle, & que le dessous du Corps est de couleur cendrée.

Celui-ci m'a été, envoyé; parmi d'autres Insectes de Tranquebar, sur la côté de Coromandel.

Fig. 38. LA MANTE ÉTROITEMENT CORNUE.

(de la 2^{me} Famille.)

La Tête de cet Insecte est, par derrière



twee stompe hoornen, de Oogen zyn klein en bruin van kleur; het Borststuk, en Agterlyf zeer smal en nevens de lange Pooten strookleurig hoewel het Agterlyf meer naar het bruine helt. De Dekschilden en Vleugels zyn netswyze geadert, wit en doorschynend. Over het geheel gelykt dit Dier naar een Spook, maar wegens de vangpooten en de langwerpig driehoekigen Kop, behoort het zelve met recht onder de Wandelende Blaaden. Men vind ze te *Tranquebar*

Fig. 39. EEN ONVOLWASSEN SPOOK.

(van 't 1^{ste}. Gezin.)

Deze behoort onder die zoorten welken men wegens hunne dunne en smalle Lyven den naam van *Scherminkel* geeft. Ik kan by deze afbeelding niets meer zeggen dan dat de Sprieten kort, en de Kop zeer klein is, het voorwerp waarna de afbeelding is gemaakt is nog onvolwassen en dierhalven niet wel te bepaalen tot welke soort dezelve van die op de volgende XIII. XIV. en XV^{de} Platen behoort. Men vind ze te *Tranquebar*.

Fig. 40. DE BEHOEFTIGE.

Van 't Geslacht der Wandelende Bladen.

(Van 't 1^{ste}. Gezin.)

De Heer HERBST in *Berlyn* is de eer-

rière, fournie de deux Cornes émoussées les Yeux sont bruns & petits; le Corcelet & l'abdomen très étroits, de même que les longs piés couleur de paille quoique l'abdomen tire beaucoup plus sur le brun. Les Etuis & Ailes sont veinés à réseau, blancs & transparents, en general cet animal ressemble à un spectre; mais relativement à ses pinces ou Serres, à sa Tête longitudinale, il appartient à juste titre au Genre des Mantes. On les trouve à *Tranquebar*.

Fig. 39. UN SPECTRE IMPARFAIT N'AJANT PAS ENCORE ACQUIS SA CROISSANCE.

(de la 1^{re}. Famille.)

Cette Espèce appartient aux sortes qu'on nomme *Squelettes*, accusée de leurs Corps minces & étroits. Je n'en puis dire d'avantage, dans cette représentation, sinon que les Antennes sont courtes, très minces, & la Tête très petite. L'objet d'après le quel celui-ci a été dessiné & peint étoit imparfait dans sa Croissance; & pour cette raison l'on n'en pouvoit pas déterminer grand chose, & à quelle Espèce, de même que celles sur les planches suivantes XIII. XIV. & XV. appartiennent. On les trouve à *Tranquebar*.

Fig. 40. L'INDIGENTE.

du Genre des Mantes

(de la 1^{re}. Famille.)

Mr. Herbst à *Berlin* est le premier,
F 3 ste

ste die ecne afbeelding van 't Wyfje van deze soort heeft gegeven en wel in *het Archiv der Insecten Geschichte* (*). Hier geve ik die van het Mannetje, waardoor dan wegvalt de gedachte van gemelden Heer HERBST, dat de *Mant. Pectinicornis* van LINNÉ en FABRICIUS, het Mannetje zoude zyn. Deze heeft op den Kop, tusfchen de Oogen een hoorn, 't welk in 't midden is gespleeten, de Mond is met zwarte Nypers voorzien; het Borststuk is smal, doch aan 't begin van 't tweede lidt breed en hartvormig; de Vangpooten aan de Beenen en Klaauwen fcherp gedoornt, bruinagtig geel met bruine vlakken: de overige vier Pooten hebben aan de gewrigten der Schenkels by het knie een breed vlies; deze Pooten zyn mede geclagtig met bruine ringen en vlakken. Het Agterlyf is smal en bruin van kleur, de Dekfchilden bleekgroen en aan de randen geel; de Vleugels wit en doorschynend. Men vind dit Insect op de kust van *Coromandel*.

qui ait donné la représentation de la femelle de cette Sorte, & même dans l'*Archive de l'histoire des Insectes*. Je donne ici celle du Mâle, par où l'opinion de Mr. HERBST se trouve dénuée de fondement, en alléguant que la *Mantée Pectinicornis* de LINNÉ & FABRICIUS, Serait le mâle de Cette sorte.

Celui-ci a sur la Tête entre les Yeux une Corne, qui est fendue dans son milieu, sa bouche est garni de Machoires noires; le Corcelet est étroit; mais au commencement du Second Article large & en manière de Cœur. Les pinces, ou Serres, aux jambes & Griffes, pourvues d'épines aiguës, brunes jaunâtres avec des Taches brunes. Les autres quatre piés ont aux jointures des Cuisfes auprès du Genou une large membrane. Ces piés sont aussi jaunâtres avec des Anneaux & taches de couleur brune. L'abdomen & étroit & brun; les Etais verts pâles & jaunes sur les bords, les Ailes blanches & transparentes. L'on trouve cet Insecte sur la côte de *Córomandel*.

(*) FABRICIUS *Sp. ins.* I. pag. 346. n. 9. *Mant. Pauperata*. Idem. *Mant. ins.* I. pag. 227. n. II. EUSLY. *Archiv der Insecten*. Heft, 7 en 8. pag. 187. n. I. Tab. 51. Fig. 1.

P L A A T XI.

P L A N C H E XI.

Fig. 41. HET GESPRENKELTE
WANDELLENDE BLAD

Fig. LA MANTE BIGARRÉE.

(van 't 1^{ste}. Gesin.)

(de la 1^{re}. Famille.)

Heeft lange en draadvormige Sprietten, de Kop is plat, de Oogen groot en uitpuilend; het Borststuk is op het midden verheven gekield en aan de

A les Antennes Filiformes longs, la Tête est plate, les Yeux grands & saillans le Corcelet est élevé au milieu, quillé sur les cotés, garni d'épines courtes. L'ab-

zy-



zyden met korte doornen bezet, het Agterlyf is donkerbruin. De Vangpoozyn onderwaarts met lange doornen gewapent, de midden en Agterpooten glad en effen, doch onder by het eerste lid der voeten met een zwarten doorn voorzien. De Dekschilden en Vleugels hebben eene bleeke bruinroode grondkleur, met donkerbruine vlakken en zyn alle netswyze geadert en doorschynend. Men vind ze op de kust van *Angola* in *Afrika* en berust met alle de op deze Plaat afgebeelde Wandelende Blaaden in het Kabinet van den Hoog Welgeb. Heere RAYE VAN BREUKELERWAERTH.

Fig. 42. HET GROOTE SCHILD-
DRAGENDE BLAD.

(van 't 1^{ste}. Gezin)

Het schynt my toe dat dit Wandelende Blad niet het zelvde is met dat 't geen Juffrouw M. S. MERIAN op haare 27 *Plaat* der Surinaamsche Insecten heeft afgebeeld, en door RÖSEL (*), is overgenoomen, als mede door den Ridder LINNÉ onder den Naam *Strumaria* (*kroppige*) (†), is beschreeven en door anderen daar in is nagevolgt. Behalven de kleur, dan zyn de Dekschilden en Vleugelen van deze niet zo lang, egter meer rond aan de tippen dan die van MERIAN, RÖSEL of de hier volgende Fig. 45. op *Plaat* XII.

Ik zal my niet ophouden met aan-

L'abdomen est brun foncé. Les pinces sont en dessous armées de longues épines, les piés du milieu & de derrière sont unis & sans stries, cependant au premier article des tarses & en dessous, munis d'une épine noire. Les Etais & Ailes ont un fond de Couleur d'un brun rouge pâle, avec des tâches brunes foncées & sont toutes veinées à réseau & transparentes. On les trouve sur la côte d'Angola en Afrique, & celle-ci, de même que toutes celles représentées sur cette planche, sont dans le Cabinet de Mr. RAYE DE BREUKELERWAERTH.

Fig. 42. LA MANTE PORTE-
ECUSON.

(de la 1^{re}. Famille.

Il me semble que cette Mante n'est pas la même que celle que Mad. M. S. MERIAN a représentée sur la 27. Planche des Insectes de Surinam, & que RÖSEL ainsi que le Chevalier de LINNÉ ont repris, sous le nom de Strumaria (écrouelleux strumofus) & ont ainsi décrite; aiant été en cela imités par d'autres. Outre la couleur; car les Etais & Ailes de celle-ci ne sont pas si longs, cependant plus ronds sur les pointes, que celle de MERIAN & RÖSEL sur la Fig. suivante 45. à la Planche XII. Je ne m'arrêterai pas à faire des remarques sur les relations qu'à faites Mad. MERIAN sur l'Origine de mer-

(*) RÖSEL ins. 2. *Locust. ind. Tab. 3. Fig. 1 en 2.*

(†) LINNÉ, *Syst. nat.* 491. n. 13. *Mant. Strumaria.*

merkingen te maaken op de vertellingen welke *Juffrouw* MERIAN heeft gedaan, wegens den oorspronk van het door haar *Id*: afgebeeld Insect, op de voorgemelde 27 *Plaat*. in haar *Werk*, als of het zelve zoude voortkoomen uit eenen oranjekleurigen worm! nog over de gedaante van het Borststuk der Blaasvormige Nymph, en 't welk alles door ROSEL getrouwelyk is nagevolgt; want uit die afbeeldingen zoude blyken, dat het Borststuk in den staat van Nymph, van den Kop tot aan den ring der Dekschilden, zoude bestaan uit drie evenwydige ringen of stukken, dewyl in regendeel het zelve in den volmaakten staat egter maar uit twee ringen, overeenkomstig met alle anderen van dit Geslacht bestaat: dergelyke afbeeldingen steunende op een verhaal van Negers behooren niet meer in onze dagen, Ik zal dan maar alleen een korte Beschryving van dit hier voor my hebbende Zeldzaame Insect trachten te geven.

De Sprieten zyn kort, draadvormig en zwart, de Kop is plat en neergedrukt, de Kaakbeenen zwart, de mond is met vier donkergeele Baartsprietjes voorzien, de Oogen uitpuilend en bruin; het Borststuk is niet breeder als dat van *Fig. 41*, en zo als het zelve zig in de afbeelding op de boven zyde vertoont, te weeten in 't midden verheven kielvormig, de randen egter zyn zeer breed en bestaan uit een plat Pergament lederagtig vlies, 't welk op de onder zyde de Borst omvat, waar door dezelve meerder verheven of dikker word dan in anderen van dit Geslacht

l'Insecte qu'elle à representé sur la susdite 27^e. Planche dans son Ouvrage, comme si cet insecte devoit provenir d'un ver couleur d'Orange, ni sur la forme du Corcelet de la chrysalide en forme de Vesie; ce qui à été fidelement suivi en tout par RÖSEL; car il devroit paroître par cette représentation, que le Corcelet, dans l'état chrysalide, consistât depuis la Tête jusqu'aux anneaux des Etuis en trois anneaux où parties parallèles; puisqu'au contraire cette même dans son état parfait ne consiste cependant qu'en deux anneaux; ce qui s'accorde avec tous les autres de ce Genre. de pareilles représentations appuyées sur un récit de nègres ne conviennent plus de nos Jours. je ferai simplement m'en possible pour donner une courte description de ce rare Insecte; que j'ai devant moi.

Les Antennes sont courtes, filiformes & noires, la Tête est plate & comprimée, les Machoires noires, la bouche pourvue de quatre barbillons d'un jaune foncé, Les Yeux saillans & bruns; le Corcelet n'est pas plus large que celui de la Fig. 41 & comme il se présente dans la Ressemblance sur le côté d'en haut savoir au milieu élevé & en forme de quille, les côtés cependant sont très larges & consistent en une membrane platte vélineuse comme parchemin, qui entoure par desous la poitrine, par où elle est plus élevée ou plus grosse que dans les autres de ce Genre d'Insectes.

Les deux serres ont aux cuisses & aux der

der Insecten. De Vangpooten hebben aan de Schenkels en Klaauwen twee ryen zwarte doornen; het Agterlyf is breed, op de bovenzyde van 't zelve, aan den laatsten ring zyn vier staartjes en door middel van een vergrootglas ontdekt men aan 't einde den Legangel: De middel en Agterpooten hebben geene doornen of kwabben en zyn dun naar maate der grootte van het Insect; de Dekschilden zyn lederagtig en nevens het geheele Lyf, bruingeel, doch over de helft, naar de agterranden met met groen gestreept en omtrent het midden met een witten vlak getekend, de Vleugels hebben eene geelagtige roode kleur en zyn doorschynend.

De Heer A. GOOTENAAR heeft dit Insect in Surinamen van den zogenaamden Blaauwen Berg ontvangen; doch t'hands berust het zelvde in het by de voorgaande Fig. 41. gemelde Kabinet.

(*) RÖSEL *ins.* 2 *Locust. ind. tab.* 3, *Fig.* 1 — 2.

(**) LINN. *syst. nat. pag.* 691. n 13. *Mant. Strumaria.*

Fig. 43. HET GEEL GERANDE
DWERGJE

Van 't Geslacht der Wandelende Bladen.

(van 't 1^{ste}. Gezin)

Heeft den Kop, het Lyf en de Poten donkergeel, de Dekschilden aan den buitenrand lederagtig en zwavelgeel van kleur, het overige der zelve is nevens de Vleugels schoon groen en doorschynend. men vind ze aan de Kaap de goede Hoop.

Griffes deux rangées d'épines noires. L'abdomen est large; sur le côté de dessus où d'en haut du même il y a au dernier anneau quatre petites queues courtes, & par le moyen d'une Loupe on découvre à l'extrémité, La Tarrière.

Les piés du milieu & de derrière n'ont point d'épines où de glandes & sont minces à proportion de la grandeur de l'Insecte. Les Etais sont vélineux & comme tout le corps d'un jaune brun; cependant sur la moitié vers les côtés de derrière raies verts & environ vers le milieu marqués d'une tache blanche, les Ailes ont une couleur rouge jaunâtre, & sont transparentes.

Mr. A. GOOTENAAR a reçu cet Insecte à Surinaam de la montagne surnommée bleuë, & est présentement avec celle qui précède la Fig. 41. dans le Cabinet susdit.

Fig. 43. LE PETIT NAIN BORDÉ
JAUNE

du Genre des Mantes.

(de la 1^{re}. Famille.)

A la Tête, le Corps & les Piés jaunés foncés, les Etais aux bords extérieurs vélineux & jaunes souffrés, tout le reste ainsi que les Ailes d'un beau vert & transparent. On le trouve au Cap de bonne Espérance.

Fig. 44. HET GEKROONDE WANDELEN-
DE BLAD.(van 't 1^{ste}. Gezin.)

Ditzeldzaame Insect is over het geheel van eene bleeke geele kleur, en en met bruin gevlaakt en geschaduwt, gelyk het zelve zig in de afbeelding vertoont. De Kop is groot de Mond met twee sterke nypers of Kaaken voorzien, agterwaarts op den Kop zyn drie verheeven punten, van welke de twee buitensten van boven zwart zyn en de middelste gespleten; deze gedaante van den Kop heeft my aanleiding tot de Benaming derzelven gegeven. Het Borststuk is breed, hartvormig, op 't midden gekield en met een verheeven rand; het Agterlyf byna zo lang als de Vleugels: de Vangpooten zyn lang en scherp gedoornd, de vier overige Pooten hebben aan de schenkels breede vliezen of kwabben, de beenen zyn niet zo regt als in anderen maar eenigzins gebogen en glad. De Pergamentlederagtige Dekschilden bevatten, door middel van den buitenrand, de zyden van het Agterlyf, de Vleugels zyn geel en doorschynend.

Fig. 44. *A.* verbeeld een nog onvolwassen van deze soort, waar aan de Dekschilden en Vleugels zig nog maar als stompjes vertoonen, doch waarvan de overige deelen van 't volmaakt Insect kennelyk zyn. Haar Vaderland is het Molukksche Eyland *Amboina*.

Fig. 44. LA MANTE COURON-
NÉE(de la 1^{re}. Famille.)

Cet Insecte rare est par tout d'une Couleur jaune pâle, taché & ombré brun ainsi qu'on le voit dans cette Efigie. La Tête est grosse munie de deux fortes Machoires, par derriere sur la Tête en avant sont trois points élevés desquels les deux en de hors sont noirs en haut & celui du milieu est fendu.

*Cette forme de Tête m'a fait naître l'idée de lui donner le nom de Mant. Coronata. le Corcelet est large, en forme de Cœur, au milieu quillé & avec un bord élevé, l'abdomen près qu'aussi long que les Ailes, les Serres sont longues & ont des épines aiguës, les quatre autres Pîes ont aux cuisses des pellicules larges où Pochons, les jambes ne sont pas si droites que dans les autres; mais en quelque façon courbes & unies. Les Etuis vélineux en parchemin embrassent par le moien des bords extérieurs les cotés de l'abdomen. Les Ailes sont jaunes & transparentes la Fig. 44. *A.* représente un insecte de cette sorte encore imparfait, dont les Etuis & les Ailes ne se montrent que comme des bourgeons, dont cependant les autres parties de l'Insect parfait sont reconnoissables. Leur patrie est l'île Moluque d'Amboine.*



Fig. 45. HET KROPPIGE WANDELENDE
BLAD.(van 't 1^{ste}. Gezin.)Fig. 45. LA MANTE ÉCROUEL-
LEUSE (Strumofan.)(de la 1^{re}. Famille.)

Deze onderscheid zig ook in meer dan eene opzigt van die welke door *Juffrouw* MERIAN en RÖSEL op de by Fig. 42. hier voor aangehaalde plaatsen zyn afgebeeld, als mede met myne evengemelde *Figuur* op de naastvoorgaande *Plaat*; wel is waar dat de gedaante der Dekschilden en Vleugels eenige overeenkomst met die der door voornoemde Autheuren afgebeelden hebben; maar welke is nu eigentlyk de door den Heer LINNÉ en andere bedoelde *Mant. Strumaria*? De afbeelding by SEBA *Thesaur. Tom. IV. tab. 69. fig. 7-8.* welke door den Heer FABRICIUS en GOEZE daarby worden betrokken, heeft gepluimde Sprieten en kan dierhalven nog met die van MERIAN nog met myne Fig. 42 of met deze overeengebragt worden, want het is niet met de wandelende Bladen gestelt als met de Nagtkapellen (*Phalaenae Bombyces.*) van welken de Mannetjes gepluimde, en de Wyfjes derzelven, op het bloote Oog draadvormige Sprieten hebben, doch welke laatste wanneer men dezelve naaukeurig beschouwt egter met dunne hairtjes zyn voorzien. De hier afgebeelde heeft lange draadvormige Sprieten, den Kop plat, driehoekig en bruinagtig geel, de Oogen uitpuilend en zwart; het Borststuk is smal, in 't midden hartvormig en verheven, de

Celle-ci diffère en plus d'un aspect de celles, qui sont dépeintes par *Mud. MERIAN & RÖSEL*, à la figure 42. aux places rapportées ici, comme aussi avec ma figure ci mentionnée sur la précédente Planche, à la vérité la forme des *Etais & des Ailes* a quelque rapport avec celle des auteurs susdits; mais la quelle est proprement la *Mantissa Strumaria*, désignée par *Mr. LINNÉ & les autres?* la *Representation* au SEBA *Thesaur. Tome IV. table 69. fig. 7-8.* qui est citée & prise pour même espèce par *Mrs. FABRICIUS & GOEZE*, a les *Antennes plumassées & ne peut-être par conséquent mise en rapport ni avec celle de MERIAN ni avec la mienne fig. 42. où avec celle-ci; il n'en est pas de même des Mantes comme des phalènes (Phalæna Bombyces.) dont les mâles ont les Antennes plumassées & les femelles Simplement à l'œil les ont filiformes; cependant ces dernières, quand on les considère de près sont pourvues de fins petits cheveux. Celle ici représentée a les Antennes longues filiformes, la tête plate, triangulaire & jaune brunâtre, les Yeux saillans & noirs. Le Corcelet est étroit, au milieu en forme de cœur & élevé, les cotés sont munis d'une membrane large, mince & vélineuse, embrassant la poitrine par dessous, tout de même qu'il a été observé à la description de la figure. 42. L'abdomène est d'un*

zyden zyn met een breed, dun en lederagtig vlies bezet, bevattende even zodanig de Borst op de onderzyde gelyk by de beschryving van Fig. 42. is aangemerkt. Her Agterlyf is vaal zwart en met licht bruine hairen bedekt en rond; De Dekschilden zyn aan de buitenranden lederagtig, doch voor 't overige dien nevens de Vleugels doorschynend. Het voorwerp waarna de afbeelding is genomen, is een Mannetje 't welk my uit *Surinamen* is toegezonden, doch berust thands in de verzameling van den Heer L. F. HOLTHUISEN.

Fig. 46. HET GAASVLIEGAGTIGE WANDELENDE BLAD.

(van 't 1^{ste}. Gezin.)

Heeft draadvormige Sprieten, den Kop, Borststuk en pooten bruingeel, het Agterlyf heeft dezelve kleurdoch met donkerbruine ringen; de hals is veel langer dan gewoonlyk in deze Insecten plaats vind, de Oogen zyn donkerbruin: de Dekschilden hebben niets lederagtigs maar zyn gelyk de Vleugels vuilwit, naar de tippen met bruin besmild en doorschynend. Op het eerste Gezigt heeft dit Insect wegens de gedaante eenige overeenkomst met de *Gaasvliegen* of *Bladhuisleeuwen* (*Hemerobius* LINN. gen. 237.) weshalven ik de benaaming deszelve daarvan ontleend heb. Men vind ze in het eyland *Ceylon* en berust in het Kabinet van den Hoogwelgeboren Heere RAYE VAN BREUKERWAERTH.

noir pâle, rond & couvert de poils bruns clairs. Les Etais sont velineux sur les bords extérieurs; mais pour le reste minces & transparens comme les ailes. L'objet, d'après le quel celui-ci a été peint, est un Mâle, qui m'a été envoyé de Surinam, & est présentement dans la Collection de Mr. L. F. HOLTHUISEN.

Fig. 46. LA MANTE (HEMEROBIUS.)
HEMEROBOÏDE,

(de la 1^{re}. Famille.

A les Antennes filiformes, la Tête, le Corcelet & les piés d'un brun jaune, l'abdomen a la même couleur, mais avec des anneaux bruns foncés. Le Col est beaucoup plus long qu'il n'est ordinairement dans ces Insectes. Les Yeux sont bruns foncés, les Etais n'ont rien de velineux; mais sont comme les ailes d'un blanc sale, vers les pointes tachées de brun & transparentes. Cet Insecte à la première vue à quelque rapport avec les Héméroboides. (*Hemerobius*) LINN. gen. 237. raison pour la quelle j'ai emprunté leur dénomination. On les trouve dans l'île de Ceylon. Elle est dans le Cabinet de Mr. RAYE DE BREUKERWAERTH.

Fig. 47. HET BONTVLEUGELIGE WANDELLENDE
BLAD MET GEPLUIMDE SPRIETEN.(van 't 1^{ste}. Gezin.)

De Sprieten zyn wederzyds gepluimd, de Kop is tusschen de Oogen met een verheven punt voorzien, het Borststuk is van boven verheven en met een plat vlies aan de zyden en aan de randen met doornen bezet. Het Agterlyf is byna zolang als de vleugels en gelyk als de andere deelen van 't geheele Lyf bruingeel. De Vangpooten zyn breed, met zwarte doornen bezet, en de vier overige Pooten hebben aan de Schenkels een kwabbig aanhangzel. De randen der Dekschilden zyn lederagtig, vuilgroenkleurig en met bleekgeele ronde vlakken gesierd, het overige gedeelte dezer Schilden en Vleugels is bleekgeel met ligt en vuilgroene golfswyze streepen en doorschynend. Men vindt ze by Tunis op de Kust van Barbaryen en berust in het laatstgenoemde kabinet.

Fig. 48. HET KLEINE GEKROONDE WANDELLENDE BLAD.

(van 't 1^{ste}. Gezin.)

Heeft korte Sprieten en op den Kop drie uitstekende punten, de oogen zyn klein; het Borststuk is ter zyden met een plat vlies bezet, in 't midden verheven, hartvormig en met bleekgeel en vuilgroen gevlaakt: het Agterlyf is geel met opwaarts verheven uitgesneden vliefige randen, overeenkomstig met die van de Fig. 33. op Plaat. IX. De Vangpooten zyn naar maate der grootte van dit Insect, breed en scherp gedoornd, de vier overige Pooten hebben aan de Schenkels een kwabbig aanhangzel. De Dekschilden zyn vuilgroen met zéegroene randen en vlakken, de vleugels wit en doorschynend. Haar vader and is de Kaap de Guede Hoop en bevindt zich nevens de twee volgende in het Kabinet van den Hoogwelgeb. Heere RAYE VAN BREUKELERWAERTII.

FARR. Sp. ins. 1. pag. 350. no. 28. Mant. Lobata? Id. m. n. i. s. s. Insect. 1. pag. 229. no. 33?

G *

Fig.

Fig. 47. LA MANTÉ AUX AILES MARQUETÉES.

(de la 1^{re}. Famille.)

Cet Insecte a les antennes plumassées des deux Côtés, la tête a entre les yeux un point élevé, le corcelet par dessus est élevé d'en haut, & garni d'une Membrane plate des deux côtés, qui sur les bords est munie d'épines, la partie de derrière du corps est presque aussi longue que les Ailes, & de même que les autres parties de tout le Corps, d'un brun jaune, les serres sont larges munies d'épines noires, les autres quatre pattes ont aux cuisses une croissance globuleuse oblongue, les Bords des Etais sont velineux d'un verd sale, & ornés de rondes taches jaunes. Le reste de ces Etais & des Ailes est d'un jaune pâle, avec des raies d'un vert clair & sale en manière de ongles en Surtout & transparentes. On les trouve à Tunis sur la cote de de Barbarie, & celle-ci est dans le Cabinet sus mentionné.

Fig. 48. LA PETITE MANTÉ COURONNÉE.

(de la 1^{re}. Famille.)

A les antennes courtes, & sur la tête trois points, qui s'élèvent & s'avancent, les yeux sont petits, le Corcelet est sur les côtés pourvu d'une pellicule plate, élevé au milieu en forme de Cocur & tacheté jaune pâle & vert sale; la partie de derrière du corps est jaune, avec des bords pelliculeux élevés en haut & dentelés, qui ont du rapport avec ceux de la Fig. 33. Sur la Plaque IX. Les serres sont proportion de la Grosseur de cet Insecte larges & munies d'épines aiguës; les quatre autres pattes ont aux cuisses des croissances globuleuses, les Etais sont d'un vert sale avec des bords & des taches de couleur celadon, les Ailes blanches & transparentes, leur Patrie est le Cap de bonne de Esperancé, cette même avec les deux Suivantes se trouvent dans le cabinet de Mr. RAYE DE BREUKELERWAERTH.

Fig. 49. DE EENVLAK.

Fig. 49. LA MANTE À UNE TACHE.

Van 't Geslacht der Wandelende Bladen.

du Genre des Mantes.

(van 't 1^{ste}. Gezin.)(de la 1^{re}. Famille.)

Waarschynlyk is het Lyf van dit Wandelende Blad voorheen even zo groen geweest gelyk de Kop en Pooten nog zyn, en heeft alleen maar door indroogen de bruine kleur aangenomen. De Sprieten zyn lang, de Oogen uitpuilend en de Kop is plat; de Vangpooten hebben aan de onderzyde twee ryen digt by elkander geplaatste doornen. De Dekschilden hebben den achterrand schoon grasgroen, maar het overige gedeelte derzelven is zêegroen en op het midden een langwerpigen goudgeelen vlak; de Kleur der Vleugels is groenagtig wit en doorschynend. Men vindt ze op de Kust van Coromandel te Tranquebar.

Vraisemblablement le Corps de cette Mante a été auparavant tout aussi vert que la tête & les pattes le sont encore; & na seulement contracté la couleur brune, qu'on lui voit qu'en séchant. Les Antennes sont longues, les yeux saillans, & la tête plate. Les serres ont par dessous deux rangées d'épines placés tout près les uns des autres. Les Euit debord exterieur d'un beau verd de Gazon, & tout le reste des Euit est de Couleur celadon. Sur le milieu une tache longitudinale d'un jaune d'or. La couleur des Ailes est verdâtre, blanche, & transparentes. C'est à Tranquebar sur la cote de Coromandel qu'on les trouve.

Fig. 50. HET. BONTE GEKROONDE WANDEL-
LENDE BLAD.Fig. 50 LA MANTE BIGARRÉE
COURONNÉE.(van 't 1^{ste}. Gezin.)(de la 1^{re}. Famille.)

Deze heeft eenige overeenkomst met die van Fig. 48. maar de gedaante van den Kop; waarop vieropwaarts staande punten geplaatst zyn, en van 't Borststuk wyzt genoegzaam aan dat dezelve met elkander zyn onderscheiden. Het Agterlyf is bruinagtig geel, aan de zyden met vliezen bezet en plat. De Vangpooten zyn niet dikker dan de middel en agterpooten, en de vier laatstgenoemde gekwaad en geel met bruine ringen. De Dekschilden hebben eene bleeke groene kleur, ieder met twee witte vlakken en nevens de witte vleugels doorschynend. Zy woond aan de Kaap de Goede Hoop.

Celle-ci a quelque rapport avec celle de la Fig. 48: mais la forme de la tête, ou quatre points placés horizontalement, & celle du Corcelet montre suffisamment qu'elles diffèrent ensemble. La partie de derrière du Corps est d'un jaune brunâtre, plate & garnie de pellicules sur les Côtés. Les serres ne sont pas plus grosses que les pattes de milieu & de derrière, les quatre dernières aiant aux cuisses des croissances globuleuses, & jaunes avec des anneaux bruns. Les Euits ont une Couleur verte pâle, chaque a deux taches blanches, & les ailes blanches, & transparentes. Elle habite au Cap de bonne Espérance.



Fig. 51. HET BERKEN-TAKJE.

*Van 't Geslacht der Spooken.**(van 't 1^{ste}. Gezin.)*

Dit Insect is by de Verzamelaars van Insecten, wegens deszelvs dunne Lyf en lange Pooten, onder de Benaming van *Scherminkel* bekend. De Sprieten zyn zo lang als het halve Lyf en borstelagtig, bestaan uit veele kleine leedjes en benevens het geheel Insect bruin van kleur; de Kop is langwerpig rond, de Mond is met twee scherpe Kaaken of Nypers en vier Baardsprietjes of Proevers voorzien, en bestaat voorts uit eene breede gespleeten onder en bovenlip, gelykerwys allen die onder het Geslacht der *Spooken* behooren.

De voorste Pooten zyn aan 't begin, by 't gewrigt van 't Lyf, dun en buitenwaarts geboogen, waarschynlyk om aan den Kop eene vrye beweging te verschaffen, en dit is een merkteken 't welk doorgaat by allen die in dit geslacht behooren, voor 't overige zyn alle ses Pooten effen en glad, behalven dat 't einde van ieder Schenkel, by het lidt van het Scheenbeen of Knie een spitzen, en op het eerste lidt der Voeten eenen stompen, en wederom aan 't einde van het Been agter den Voet, eenen spitzen doorn heeft. Het voorwerp waarna deze afbeelding is gemaakt, is een Wyfje, deze zyn onge vleugeld en nimmer is my, hoe veel ik ook van deze soort gezien heb, eene voorgeko-

Fig. 51. LA BRANCHE DE BOUILLOT.

*Du Genre des Spectres.**(de la 1^{re}. Famille.)*

Cet Insecte est chez les amateurs, qui font Collection d'Insectes, connu sous le Nom de Fluet, Acause de son Corps menu & de ses longs pattes. Les antennes sont aussi longues que la moitié du Corps & Soyeuses, consistent en plusieurs petits articles, sont de couleur jaune, come tout le Corps de l'Insecte. La tête est d'une rondeur Longitudinale, la bouche est munie de deux machoires aiguës & de quatre Barbillons, elle consiste en haut & bas en une lèvre largement fenduë, pareillement à tous les Insectes, qui sont du Genre des Spectres.

Les pattes dedevant, sont au commencement & à la jointure du Corps menus & courbés en dehors, vraisemblablement pour donner plus de liberté aux mouvemens de la tête, & c'est une remarque universelle dans ceux qui appartiennent à cette Espèce, du reste les autres six pattes sont unis, excepté qu'à la fin de chaque Cuisse, à l'article de la jambe ou Genou, cet Insecte a une épine pointuë, & au premier article des Tarses il a une pointe émouffée & de rechef vers l'extrémité de la jambe, derrière la Tarse il a une épine pointuë. L'objet d'après lequel ce dessin a été pris, est une femelle, elles sont sans ailes. Je n'en ai encore jamais vuës, quoiqu'il m'est soit passé beaucoup sous les yeux de cette sorte, où l'on ait pu voir la moindre apparence d'étuis où fourreaux

men, waaraan de minste blyk van Dek- of Vleugelscheeden te merken was. Deze kan dan dierhalven niet de *Mant. Phthistica* van LINNÉ (*) nog de *Necydaloïdes* van FABRICIUS (**) zyn, hoewel daarby de 19^{de} Plaat in het 2^{de} Deel van RÖSEL *inf.* beluſt. ten onrechte word aangehaald, want de Fig. 9. der gemelde Plaat is niets anders als de Nymph voor de laaſte verhuïding van Fig. 1. op myne *Eerſte Plaat* van dit Werk, en de Fig. 10. der evengemelde Plaat van RÖSEL is dezelve die ik hier in afbeelding geve. RÖSEL heeft met alle Recht de Beſchryving van MARCGRAAF in deſzelvs *Hift. Rer. Natur.* pag. 251 tot dit Inſect betrokken, want het is de *Arumatia* der Braſilianen. Ik heb verſcheide van deze Inſecten, gedroogt en op Kildivel in Vleſſen gezet, van *Surinamen* ontvangen: zy worden aldaar door de Inlanders en Negers met den Naam van *Mesquiten Mama* beſtempeld, niet als of die laſtige kleine ſteekende Muggen, *Mesquites*, daar uit zouden voortkomen, maar om dat deze Spook, wanneer ze gedrukt word, zig verweerd en byt, 't welk de Negers het ſteeken noemen.

d'aïles. C'eſt donc pourquoi celle-ci ne peut être conſidérée pour la *Mante Phthistique* ni de Linné, ni le *Necydaloïdes* de Fabricius, encore quedans la 2^e partie de RÖſel *inf.* beluſt. Planche 19^e il en ſoit aſſez mal à propos fait mention; car la Fig. 9^e de la d^e. Planche n'eſt autre choſe que la Nymph avant la dernière métamorphoſe de la Fig. 1^e ſur ma *Première Planche* de cet ouvrage & la Fig. 10. de la ſuſdite Planche de RÖſel eſt la même, dont je donne ici la représentation. RÖſel à tiré la deſcription de Marcgraaf, dans ſon *hiſt. Rer. Natur.* pag. 251. touchant cet Inſecte avec raiſon fondée; car c'eſt vraiment l'*Arumatia* des Braſiliens. J'ai reçu pluſieurs de ces Inſectes, tant Seches, que mis dans des flacons avec du Rum, venus de Surinam. Là les habitans & nègres les deſignent ſous le Nom de *Mesquites Mama*, non come ſi ces petites mouches piquantes très incommodes *Mesquites* duſſent en provenir; mais par ce que ce Spectre, quand on le prend, ſe deffend & mord, raiſon qui fait que les nègres n'ont cela picquer.

(*) LINN. *ſyſt. nat.* pag. 687. n. 2.

(**) FABRICIUS. *ſp. ins.* Tom. 2. pag. 345. n. 2 RÖSEL *inf.* Tom. 2. pag. 122. Ta^b. 19. fig. 10.

Fig. 52. DE SPOOK MET GEBOOGEN
VOORFOOTEN.(van 't 1^{ste}. Gezin.)

Heeft de Sprieten ongemeen lang en hairvormig de Oogen groot en uitpuilend, de Kop en 't Lyf donkerstrookleurig; de Schenkels der voorste Pooten zyn aanmerkelyk meerder uitwaarts geboogen dan by anderen, doch hebben dezelve nevens de overige Pooten geene doornen, maar zyn effen en glad. De Dekschilden heeft zy klein en lederagtig, doch de Vleugelen zyn lang, vliezig, en doorschynend. Het is een Mannetje 't welk in *China* word gevonden.

Fig. 53. HET SMALLE CHINEESCHE GE-
HOORNDE WANDELENDE BLADT.(van 't 2^{de}. Gezin.)

De Sprieten zyn hairvormig, de Kop is driehoekig, gelyk die van alle wandelende Bladen, doch is dezelve agterwaarts, in 't midden, gespleeten en als in twee hoornen verdeeld; de Kop en Borststuk zyn strookleurig en het Agterlyf is bruin. De Vangpooten hebben ieder eenen langen scherpen klauw en zyn inwaarts gedoorndt. De Dekschilden hebben eene Zeegroene kleur, en de Vleugels zyn wit en doorschynend. Het is eene verscheidenheid van Fig. 38. op de voorgaande X^{de} Plaat, doch deze word in *China* gevonden, en berust met de twee voorigen in de ryke Verzameling van den Hr. L. F. HOLT-
HUISEN.

Fig. 52. LE SPECTRE AUX PIÉS DE
DEVANT COURBÉS.(de la 1^{re}. Famille.)

Il a les antennes extraordinairement longues en forme de Cheveux, les yeux grands & saillans, la tête & le Corps couleur de paille foncée, les Cuisses des pattes de devant sont remarquablement plus courbées en dehors que dans d'autres de ces Insectes, cependant ils n'ont point d'épines ni aux autres pattes, mais les ont tout à fait unis. Il a les étuis petits & velineux, ses ailes sont longues membraneuses & transparentes. Celui-ci est un Mâle, qui a été trouvé en Chine.

Fig. 53. LA MANTE CHINOISE ÉTROIT-
TES CORNUS.(de la 2^{me}. Famille.)

*Il a les antennes en forme de cheveux; la tête triangulaire, comme celle de toutes les Mantes, cependant cette tête est fendue au milieu & comme Corcelet partagée en deux cornes; la tête & le font couleur de paille & l'abdomen brun; les serres ont chacune une griffe longue & aiguë & sont garnies d'épines en dedans. Les Étuis sont de couleur Céladon, les ailes blanches & transparentes. Il y a une différence de Figure 38, sur la Planche précédente X, toutefois celle-ci a été trouvée en Chine & est avec les deux ci devant dans la riche Collection de Mr. L. F. HOLT-
HUISEN.*

Fig. 54. DE BLADERPOOTIGE
SPOOK.(van 't 1^{ste} Gezin.)

Deze Spook is de eenigste, welke my van deze soort ooit is voorgekomen. De Sprietten zyn gelyk het geheele Insect, bruin omberkleurig, de Oogen aschgrauw, de Baardsprietjes lang, en de Mond is met twee zwarte Kaakebeenen of Nypers voorzien. De twee voorste Pooten hebben ter zyden aan de Scheenbeenen dunne Vliesen, waar door dezelve veel breeder schynen; de Schenkels zyn mede aan de zyden met twee van elkander afstaande Vliesen voorzien, waar door eene holte of goot werd veroorzaakt, in welke het Insect de Scheenbeenen kan plaatzen: de middelste Pooten hebben alleen maar aan de Schenkels bladerige Vliesen, die egter voorwaarts zyn uitgesneden, gelyk uit de afbeelding is te zien, doch de Beenen zyn effen en glad: de Agterpooten zyn in tegendeel wederzyds met meergemelde Vliesen voorzien, en de Beenen derzelven hebben maar een enkel Vlies agterwaarts, waardoor zy deze Beenen eveneens als die der voorste Pooten kunnen plaatzen. Het voorwerp waarna wy deze afgebeeld hebben, is een Wyfje, waaraan geene spoor of beginfel van Dekschilden of Vleugelscheeden zyn te ontdekken, zy berust in de laatstgenoemde Verzameling, en word op het Molukkiſche Eyland *Amboina* gevonden.

Fig. 54. LE SPECTRE AUX PAT-
TES FEUILLÉES.(de la 1^{re}. Famille.)

Ce Spectre est l'unique, que j'aie jamais vu en ce Genre, les Antennes sont comme tout le Corps de couleur brune ombrée, les yeux gris cendrés, les Barbillons longs, & la bouche garnie de deux mâchoires noires. Les deux Pattes de devant ont sur les côtés des jambes des Membranes minces, qui les font paroître beaucoup plus larges, les cuisses sont munies sur les côtés de deux Membranes distantes l'une de l'autre, ce qui occasionne un creux où emplacement où l'Insecte peut placer ses jambes; les Pattes du milieu ont seulement aux cuisses des Membranes feuillées où à Lames, qui cependant sont coupées par devant, comme on le peut voir dans la représentation ici; mais les jambes sont toutes unies. Les pattes de derrière sont au contraire fournis de chaque côté de plus de Membranes susdites, & les jambes n'ont qu'une seule Membrane par derrière, par où ils peuvent placer les jambes tout de même que celles des pattes de devant. L'objet, d'après lequel nous avons fait cette représentation, est une femelle, où il n'y a point de vestige où commencement d'Etais où fourreaux d'Ailes à découvrir; elle est dans la dernière Collection citée & se trouve dans l'île moluque-d'Amboine.

Fig.



Fig. 53. HET CHINEESCHE GERAAMTE.

(van 't 1^{ste}. Gezin)

Deze Spook heeft bruine borstelagtige Sprieten, aschkleurige Oogen en is over het geheele Lyf lichtbruin, en aan het einde der Schenkels bruinagtig geel; het Borststuk is, van boven, met kleine aschkleurige ronde pukkels bezet, doch voor 't overige glad, het Agterlyf is zeer dun, hebbende de Ringen aan 't zelve niet oneigen de gedaante de Wervelbeenen aan de ruggegraaten der Visfchen. De Pooten hebben aan de Schenkels en Voeten dergelyke doornen, als by Fig. 51. op de voorgaande XIII Plaat is aangewezen. De afbeelding is naar een Wyfje, 't welk uit China is gezonden en berust by den Heer L. F. HOLTHUISEN.

Fig. 56. DE ASCHKLEURIGE SPOOK.

(van 't 1^{ste}. Gezin.)

Heeft het geheele Lyf nevens de Pooten donker aschkleurig, de Schenkels der voorste Pooten zyn wederzyds met een smal Vlies bezet, waardoor dezelve breeder schynen, dan die der andere Pooten; het Borststuk is glad en op de onderzyde, gelyk het Agterlyf plat, doch van boven rond. De kleine Dekfchilden zyn lederagtig, de buitenranden der Vleugels hebben eene bleek purper kleur, maar voor het overige vliesagtig en netswyze geadert. Het is een Mannetje, 't welk in Surinamen word gevonden.

Fig. 55. LE SQUELETTE CHINOIS.

(de la 1^{re}. Famille.)

Ce Spectre à les Antennes Soyeuses & brunes, les yeux de couleur Cendrée & a tout le Corps d'une couleur de brun clair, & n'a que les extrémités des Cuisses d'un jaune brunâtre; en haut le Corcelet est garni de petites pustules rondes couleur de Cendre, mais le reste uni. L'abdomen est très menu, y aiant des anneaux assez Semblables aux Articles osseux des grosses arrêtes sur l'épine du dos des poissons. Les pattes ont aux Cuisses & Tarses de Pareilles épines, comme il est montré sur la Planché précédente XIII, à la Fig. 51. cette représentation a été prise sur une Femelle, qui a été envoyée de la Chine, & gît dans la Collection de Mr. L. F. HOLTHUISEN.

Fig. 56. LE SPECTRE DE COULEUR CENDRÉE.

(de la 1^{re}. Famille.)

Il a tout le Corps, ainsi que les pattes de couleur de Cendre Foncée, les Cuisses des pattes de devant sont des deux côtés fournies d'une Membrane étroite, ce qui les fait paroître plus larges que celles des autres pieds; le Corcelet est uni & par en dessous ainsi, que l'Abdomen plat, mais rond d'en haut, les petits Etais sont vélineux, les bords extérieurs des Ailes, sont d'un pourpre pâle, mais du reste les Ailes Membraneuses & Veinées à Réseaux. Celui-ci est un mâle, qui fut trouvé à Surinam.

Fig. 57. HET GEHOORNDE SPOOK
OF GERAAMTE.(van 't 1^{ste} Gezin.)

Deze schynt op het eerste gezigt, dezelve te te zyn met Fig. 51 of 55. op de twee voorgaande Platen, maar de twee op den Kop voor uitstaande stompe Hoornen, welke by Fig. 57. A. op den door het vergrootend glas afgebeelden Kop duidelyk zyn te zien, en die aan de twee even gemelde ontbreken, wyzen genoegzaam aan, dat deze eene byzondere soort is, ook zyn de voorste Pooten, naar maate der grootte van het Insect niet zo breed als van Fig. 51 of 55. De borstelagtige Sprietten bestaan, gelyk die van alle dezer Insecten, uit kleine dicht op elkan- der geplaatste, voor het bloote oog on- zichtbaare leedjes: het Borststuk is met verheven witte pukkels bezet, en heeft gelyk alle de andere deelen des Lyfs en Pooten, eene bleke bruine kleur. Ik heb deze soort uit Surinamen ont- vangen, maar dezelve berust nu in de verzameling van den Heer L. F. HOLT- HUISEN.

Fig. 58. HET GROENE PODAGRA WAN-
DELENDE BLADT.(van 't 1^{ste} Gezin.)

Op de kleur van dit Insect is weinig

Fig. 57. LE SPECTRE OU SQUELETTE
CORNU.(de la 1^{re} Famille.)

Celui-ci semble, à la première vuë être le même qu'aux Fig. 51 où 55. sur les deux Planches précédentes; mais les deux Cornes émoussées, qu'on voit sur la Tête s'élever en avant & qui paroissent plus visiblement & clairement, quand on fixe avec une Loupe la Tête représentée de la Fig. 57. A. & qu'on ne voit pas aux deux ci men- tionnées, démontrent suffisamment que c'est une espèce à part. Les pieds de devant ne sont pas aussi, à proportion de la Grandeur de l'Insecte, aussi Grandes que ceux des Fig. 51 où 55. Les Antennes soyeuses consistent, de même qu'à tous ces Insectes, en de petits Articles placés tout près l'un sur l'autre, que la simple vuë ne peut discerner, le Corcelet est garni de pustules, blanches élevées & a, comme toutes les autres parties du Corps & des pieds, une couleur d'un brun pâle, j'ai tiré cette espèce de Su- rinam, mais elle est actuellement dans la Collection de Mr. L. F. HOLTHUISEN.

Fig. 58. LA MANTE GOUTTEUSE
VERTE.(de la 1^{re} Famille.)

Il y a peu de fond à faire sur la cou-
staat



57. A.



57



58. A.



58



60



59

staat te maaken, en zelden vind men dat de Dekschilden, veel min het Lyf, eene zuivere groene kleur hebben, dit werd veroorzaakt, dat wanneer deze Insecten gevangen zyn, de vogten, welke als dan zig nog in het Agterlyf en andere Deelen derzelven bevinden, allengskens uitdroogen en eene bruingeel kleur veroorzaaken. Ik heb my voor altoos eene wet gesteld, in de afbeelding nimmer van die kleuren aftewyken, welken de Insecten, dood zynde, als dan hebben; en Kenners zullen wel mede toestemmen, dat men deze Dieren, gelyk alle andere die onder de 2^{de} Orde der Insecten, welke lederagtige Dekschilden hebben behooren, gemeenlyk vind, dat de kleuren verflenst, het geen voor heen groen was, geel of wel bruin is geworden. Het voorwerp waarna wy deze afbeelding hebben gemaakt, is een Wyfje, en op het Eyland Cylon gevonden, doch worden dezelve in geheel Oostindien, als op de Kust Coromandel, Bengalen, op het Eyland Java en der Molukken aangetroffen.

De Kop is vooraan plat, doch agterwaarts op denzelven is eene aan 't einde gespleeten bladerige punt, gelyk by Fig. 58. A, aan den vergrootten Kop is te zien: de Mond heeft vier Baardsprietten of Proevers, en twee zwarte Nypers of Kaaken, en word door eene breede Lip bedekt; de Oogen zyn langwerpig rond en niet veel uitpuilend. Het voorste gedeelte van het Borststuk is op het midden verheven, Kielvormig en ter zyden met een breed en uitgesneden Vlies bezet, het overige gedeelte is rond en heeft de gedaante van eene

leur de cet Insecte, & c'est bien rarement qu'on trouve que les *Etais* & bien moins le Corps aient une couleur verte, qui soit nette. Ce qui est occasionné de ce que, quand on prend ces Insecte, l'humour, qui se trouve encore dans l'Abdomen & autres parties, venant à sècher lentement, produit une couleur d'un jaune brun. Je me suis fait une Loi pour toujours de ne jamais m'écarter, dans les représentations, des couleurs qu'ont les Insectes, étant morts, & les Connoisseurs, pour la plupart, conviendront qu'on trouve ordinairement dans ces animaux, ainsi que dans tous les autres, qui appartiennent au second Ordre des Insectes & qui ont les *Etais* vélineux, que les couleurs se dissipent, & ce qui étoit auparavant Vert, est devenu jaune où même brun. L'objet, d'après lequel cette représentation fut prise, est une Femelle trouvée dans l'île de Cylan, quoiqu'on les trouve dans toutes les Indes Orientales, comme sur les côtés de Coromandel, Bengale, l'île de Java & des Moluques.

La Tête en avant est platte, mais par derrière elle a sur la fin un point feuillé, fendu comme on le peut voir à la Tête qui est grosse, Fig. 58. A. La bouche à quatre Barbillons où Antennules, & deux machoires noires, qui sont recouvertes d'une Lèvre large, les yeux sont d'une rondeur Longitudinale & peu saillans. La partie antérieure du Corcelet est élevée sur le milieu, quillée & sur les côtés munie d'une Membrane large & découpée, le reste est rond & à la forme d'un fistule mince, l'Abdomen est large sur sa fin, sur les côtés feuillé aux Anneaux. La Tarrière est placée au dernier Anneau. Les *Etais* sont vélineux courbés aux bords extérieurs d'un-

dunne Buis ; het Agterlyf is aan het einde breed, ter zyden aan de Ringen gebladert en aan den laafsten Ring is de Leg-angel geplaatst. De Dekschilden zyn lederagtig, aan de buitenranden omhoog, en hebben de gedaante van een uitgesneden blad, de Vleugels zyn klein, wit van kleur en doorschynend. De Vangpooten hebben aan 't einde van de Dye een fcherpen doorn, de Schenkels en Beenen, of liever Klaauwen, zyn ieder met twee ryen korte doornen gewapend: de Schenkels der Midden- en Agterpooten hebben naby 't gewrigt der Scheenbeenen, onderwaarts, een bleedbladerig Vlies en bovenwaarts twee kleiner gespleeten dergelyke Vliesen, voorts zyn deze Pooten ongedoorn en glad. De gemelde Vliezen aan de laatstgemelde Pooten, hebben voorze-ker aanleiding tot den Bynaam van *Podagra-blad* gegeven, en het is ook onder deze benaming, dat dit Insect by de Schryvers en Verzamelaaren bekend is. De Fig. 59. is dezelve, maar in den rustenden stand te zien. Beide deze voorwerpen bevinden zig nevens dat van Fig. 60. in de Verzameling vanden Hr. L. F. Holthuisen.

♂ ont la forme d'une feuille échancrée. Les ailes sont petites blanches & transparentes. Les Griffes ont à la fin de la hanche une Epine aiguë, les cuisses & jambes, ou plutôt les serres, sont armées de deux rangées de courtes épines à chaque, les cuisses des pattes du milieu & de Derrière ont près de la jointure de la Jambe pardeffous une large Membrane & pardeffus deux petites Membranes pareilles, mais fenduës, du reste ces dits pattes sont unis & sans épines. Les dites Membranes des derniers pattes susdits, ont certainement donné lieu à la Dénomination de Mante goutteuse & c'est aussi sous ce nom que cet Insecte est connu chez les Auteurs & ceux qui en font Collection. La Fig. 59. est la même, toute fois vuë dans un état de repos. Ces deux objets, de même que la Fig. 60. sont dans la Collection de Mr. L. F. Holthuisen.

LINNÉ *syst. nat.* pag. 690. n. 4. *Mant. Gongylodes.* FABRICIUS. *sp. inf.* Tom. 2. pag. 346. n. 8.
Mant. Gongylodes. RÖSEL *inf.* Tom. 7. Fig. 1-2-3

Fig.



Fig. 60. HET GESTIPPTELDE GLASVLEUGELIGE WANDELENDE BLADT.

(van 't 1^{ste}. Gezin.)

Heeft de Sprieten dun en hairvormig, de Kop is plat, de Oogen zeer groot, rond en verre buiten den Kop geplaatst; het Borststuk is op 't midden verheven, kielvormig en aan de randen met korte doornen bezet. De Dekschilden zyn aan den buitenrand min of meer lederagtig en heldergroen; maar het overige gedeelte derzelven is bleek geelagtig groen, netswyze geadert, doorschynend en met onregelmatige vaalzwarte vlakjes en stippen getekend. De Vangpooten heeft zy breed en scherp gedoornd, de Vleugels zyn wit en glasagtig doorschynend. Men vindze te *Tranquebar* op de Kust van *Coromandel*.

P L A A T XVII.

Fig. 61. HET VERDORDE PODAGRA-BLADT.

(van 't 1^{ste}. Gezin.)

Deze heeft eenige overeenkomst met de Fig. 58 en 59. op de voorgaande XVde *Plaat*; maar daar hier de natuurlyke kleur in 't algemeen bruinagtig geel is, zo zyn ook de Sprieten merkelyk gepluimd en de Dekschilden en Vleugels hebben eene geheel andere gedaante: de Kop is agterwaarts

Fig. 60. LA MANTE AUX AÎLES DIAPHANES MOUCHETÉES.

(de la 1^{re}. Famille.)

Elle a les Antennes filiformes très fins, la Tête platte, les Yeux fort grands ronds & placés bien loin de la Tête; le Corcelet est élevé sur le milieu, quillé & sur les côtés garni de courtes épines. Les Etais sont aux bords extérieurs plus ou moins vélineux & d'un vert clair, mais le reste en est d'un vert jaunâtre pâle veiné à réseaux, transparent & irrégulièrement marqué de petites tâches ou points d'un noir-fauve. Les Griffes sont larges munies d'épines aiguës. Les Aîles blanches & transparentes diaphanes. Elle se trouve à Tranquebar sur la côté de Coromandel.

P L A N C H E XVII.

Fig. 61. LA MANTE GOUTTEUSE BRUNE.

(de la 1^{re}. Famille.)

Celle-ci a quelque rapport avec la Fig. 58 & 59. sur la Planche précédente XVI. mais ici la couleur naturelle est en général d'un jaune brunâtre. Les Antennes sont visiblement pectinées, & les aîles ont une toute autre forme. La Tête est munie par derrière d'un point très éfilé, & les Yeux sont d'une rondeur

met een spitse punt voorzien, en de Oogen zyn langwerpig rond (*). Het voorste gedeelte van 't Borststuk is aan de zyden plat, vliefig en aan de randen uitgesneden, als by Fig. 58. het overige gedeelte van 't gemelde Borststuk is spilrond, zeer dun en glad, tot aan den derden ring of het eigentlyke tweede Borststuk, waaraan de middelpooten gehegt zyn; het Agterlyf is breed en ter zyden gebladert. De Dekschilden zyn langer dan die van de gemelde soort, aan de buitenranden lederagtig, maar voor 't overige met de vleugels netswyze geaderd en doorschynend; de Schenkels der Vangpooten zyn breed en zo als de Klaauwen scherp gedoornd. Aan de Schenkels der Middel- en Agterpooten hebben zy, naby het gewrigt der Been en twee bladerige vliezen, doch kleiner dan de meergemelde Fig. 58. Ik heb dit *Wandelendblad* van Samarang op de Noordoostkust van Java ontvangen; ook heb ik 'er gezien die van Amboina en ook van de Kust Coromandel waren gezonden. Zy berust nu nevens de drie eerstvolgenden, in de Verzameling van den Heer L. F. HOLTHUISEN.

(*) Ik kan hier niet voorby om eene aanmerking te maaken, te weten, dat aan alle my tot heden bekende Wandelende-Bladen, die een zulk verlengzel of punt op den Kop hebben, gelyk deze en meerder reeds afgebeelde soorten, de Oogen altoos kleiner, ovaal en minder uitpuilende hebben, dan die welker Kop glad, plat en effen is.

longitudinale ()*, la partie antérieure du Corcelet est platte sur les côtés, membraneuse & échancrée sur les bords comme à la Fig. 58. tout le reste du Corcelet est cylindrique très-mince & uni jusqu'au troisième anneau, où proprement dit le second Corcelet où les pattes du milieu attachent. L'Abdomen est large & feuillé sur les côtés. Les Etais sont plus longs que ceux de la susdite espèce, vélineux aux bords extérieurs; mais pour le reste, ainsi que les ailes, veiné à réseaux & transparent. Les Cuisses des Serres sont larges & comme les Griffes pourvues d'épines aiguës. Elles ont aux cuisses des pattes du milieu & de derrière, tout près de la jointure des Jambe deux membranes feuillées mais plus petites que celles de la Fig. 58. déjà mentionnée. J'ai reçu cette Mante de Samarang sur la côte de Nord Est de Java. J'en ai aussi vues, qui avoient été envoyées d'Amboine, & de la côte de Coromandel. Elle est avec les trois premières suivantes dans la Collection de Mr. L. F. HOLTHUISEN.

(*) Je ne puis me dispenser ici de faire une Remarque; savoir que dans toutes les Mantes qui me sont connues, qui ont sur la tête une pointe ou un allongement comme celle-ci & beaucoup d'autres formes déjà représentées, les yeux sont toujours plus petits, ovales & moins saillans, que dans celles dont la tête est plate & unie.

Fig.

Fig. 62. HET BIDDENDE WANDELENDE
BLADT.(van 't 1^{ste}. Gezin.)

De Benaaming, *Religiosa*, *Oratoria*, *Precaria* enz. welke door LINNÉ, FABRICIUS en anderen, aan zommige soorten der Wandelende Bladen zyn gegeven, komt welligt daar van, dat allen van dit Geslacht, in den rustenden stand, den Kop en het Borststuk regt opwaarts houden, en de twee Vangpooten als zaamgevouwen tegens elkander en in de hoogte plaatzen. Deze gestalte heeft dan ook aanleiding gegeven voor de onkundige inwoonders dier Landen in welke deze Insecten worden gevonden, dat men aldaar dezelve *Louva-Dios*, *Prega-Diou* of ook wel *Wegwyzers* heeft genoemd; maar deze zogenaamde vroomme houding komt ten eenemaal met het stil zitten der *Spinnen* in hunne webben en der *Mierenleeuwen* (*Formica-Leo* of *Myrmeleon*) in hunne tregterswyze gaten in het zand, overeen, zy wagten naar Aas en Voedzel, het zy eene *Vlieg*, *Mier* of eenig ander Insect, 't welk zy dan ras de oorzaak van hun stil zitten doen gewaar worden.

De hier afgebeelde heeft zeer dunne hairvormige Sprietten, den Kop plat, de Oogen groot en uitpuilend; het Borststuk is in 't midden gekield en aan de randen met korte doornen bezet. De Dekschilden zyn groen, lederagtig en hebben op 't midden derzelve eenen paarschkleurigen vlak, die in zommigen gelyk deze, in 't midden bleek geel, maar in anderen roestkleu-

Fig. 62. LA MANTE DÉ-
VOTE.(de la 1^{re}. Famille.)

La Dénomination, *Religiosa*, *Oratoria*, *Precaria* &c. qu'ont donnée à quelques sortes de *Mantes* LINNÉ, FABRICIUS & d'autres, provient vraisemblablement, de ce que toutes celles de cette espèce, dans leur *État de repos*, tiennent la tête & le *Corcelet* tout droit élevés & les deux *Serrures* comme jointes ensemble & élevées. Cette position a par conséquent donné sujet aux habitans ignorans des contrées, où ces insectes se trouvent, de les nommer *Louva-Dios*, *Prega-Diou* & même aussi *Guide* où indique *Voye*; mais cette prétendue pieuse contenance s'accorde tout-à-fait avec la tranquille position des araignées dans le travail de leurs *Toiles* & des *Fourmi-lions* dans leur *Cône* établi dans du *Sable*, ils y attendent leur proie & nourriture, soit une mouche, fourmi, ou autre insecte, auxquels ils font bientôt connaître le sujet de leur *Tranquille position*.

Celle ici présentée à les *Antennes* filiformes fins comme cheveu, la tête platte, les *Yeux* grands & saillans. Le *Corcelet* est quillé dans son milieu & muni de courtes épines sur les côtés. Les *Elytres* sont verts, vélineux & ont dans leur milieu une tâche de couleur *Lilas*, qui, dans quelques unes comme en celles-ci est au milieu jaune pâle, mais dans d'autres couleur de rouille, où jaune foncé, cette tâche a presque la forme d'un œil. Les ailes sont jaunes, vertes sur les pointes, & marquées vers les bords de derrière de

rig of donker geel is, en eene byna Oogwyze gedaante heeft. De Vleugels zyn geel, aan de lippen groen en naar de agterranden met witte golfswyze streepjes getekend, egter zyn deze Vleugels weinig doorschynend. De Schenkels der Vangpooten met den Klaauw en de kraalswyze leedjes der voeten zyn groen, maar de Dyen derzelven bruin, alleen onderwaarts met doornen gewapend: de vier andere Pooten zyn zo wel als het Agterlyf bruinagtig rood. Zy is een Wyfje en word in *Surinamen* gevonden. Of dezelve ook in *Afrika* is ontdekt, gelyk LINNÆUS wil, is my nog niet gebleeken.

LINNÉ *Syst. nat. pag. 691. N. 691. Mant. Precaria. FABRICIUS Sp. inf. Tom. I. pag. 349. N. 20. Nom. Linn.*

Fig. 63. HET WEG-WYZENDE WANDELLENDE BLADT.

(van 't 1^{ste} Gezin.)

Heeft graauwe draadvormige Sprieten, de Oogen wit en uitpuilende, den Kop plat en effen, het Borststuk in 't midden kielvormig verheven en de randen van 't zelve met korte doornen bezet, de kleur van dit Borststuk en 't Agterlyf nevens de Pooten is bruingeel, de Vangpooten zyn onderwaarts met scherpe doornen gewapend en hebben aan de binnenzijde van den Schenkel eenen grooten bruinen vlak. De Dekschilden hebben eene schoone groene kleur en zyn lederagtig, de vleugels aan den buitenrand ook lederagtig maar voor 't overige geelagtig met golfswyze vuilgroene streepen en doorschynend. Ik heb ze uit *Suriname* ontvangen.

rayes blanches ondées, néanmoins ces ailes sont peu transparentes, les Cuisses des Serres, les Griffes & les articles des pieds en forme de grains enfilés sont verts; mais les hanches des mêmes sont brunes, toutes par dessous armées d'épines. Les quatre autres pattes ainsi que l'Abdomen sont d'un rouge brunâtre. Celle-ci est une Femelle, qui se trouve à Surinam. Si cette même sorte a été trouvée en Afrique, tel que LINNÉ le prétend, c'est ce qui n'est pas encore parvenu à ma connoissance.

Fig. 63. LA MANTE INDIQUE-VOYE.

De la 1^{re}. Famille.

A les Antennes filiformes grises, les yeux blancs & saillans, la tête plate & unie, le Corcelet quillé & élevé au milieu, les bords du même munis de courtes épines, la couleur de ce Corcelet, de l'Abdomen & des pattes est jaune brun; les griffes sont en dessous armées d'épines aiguës, & en dedans des Cuisses, elles ont une grande tache brune. Les Elytres ont une belle couleur verte & sont vélineux, Les ailes aussi vélineuses aux bords extérieurs, mais pour le reste jaunâtres avec des rayes d'un vert sale ondées & transparentes. J'ai tiré cet Insecte de Surinam.

Fig.

Fig. 64. HET GROENE GLASVLEUGELIGE WANDELENDE BLADT.

(van 't 1^{ste} Gezin.)

Deze is in verscheiden opzigten onderscheiden van de Fig. 19. op de voorgaande V^{de} Plaat. De Kop is glad en effen, de Oogen zyn bruin en de sprieten draadvormig en zwart; de kleur van den Kop, het Borststuk en der Pooten is bleek groen, het Agterlyf donkerbruin en aan de twee laatste ringen geel. De Dekschilden hebben alleen maar den buitenrand enkel groen en lederagtig, het overige is bleekgroen, aan de binneranden wit en nevens de vleugels doorschynend. De Vangpooten zyn aan de onderzyde gedoornd, de vier anderen zyn daar effen en ongewapend. Zy woond te *Tranquebar* op de kust *Coromandel*.

P L A A T XVIII.

Fig. 65. HET AMBOINSCH DRAAKJE.

Van 't Geslacht der Spooken,
(en 't 2^{de} Gezin.)

Op de V^{de} Plaat Fig. 18. heb ik de afbeelding eener Nymph van eene andere soort dan deze gegeven en bladz. 14. beschreeven, hier geve ik nu een ander maar volmaakt Insect van 't 2^{de} Gezin der Spooken, welke egter wat de gedaante betreft met de evengemelde Nymph eenige overeenkomst heeft. De Sprieten zyn dik en bestaan uit eene menigte van kleine leden, de kop is

Fig. 64. LA MANTE AUX AÎLES DIAPHANES VERTES.

(de la 1^{re}. Famille.)

Celle-ci est en différens aspects différente de la Fig. 19. sur la précédente Planche V. La tête est tout à fait unie, les Yeux bruns & saillans, les Antennes filiformes & noires, la couleur de la tête, du Corcelet, & des pattes est jaune pâle, l'abdomen brun foncé & jaune aux derniers anneaux; les Elytres ont seulement le bord extérieur vert, & velineux, le reste est jaune, aux bords intérieurs blanc & ainsi qui les ailes transparent. Les griffes sont par dessous armées d'épines, les quatres autres pattes sont minces unies & sans épines, elle habite à Tranquebar sur la côte de Coromandel.

P L A N C H E XVIII.

Fig. 65. LE DRAGON D'AMBOINE.

Du Genre des Spectres,
(& de la 2^{de}. Famille.)

J'ai donné la Représentation d'une Nymph d'autre sorte que celle-ci sur la Planche V. Fig. 18. dont j'ai fait la description pag. 14. J'en donne à présent une autre ici, mais d'un Insect parfait de la 2^{de} Famille des Spectres, qui cependant a pour la forme quelque rapport avec la susdite Nymph. Les Antennes sont grosses & consistent en une quantité de petits articles, la Tête est d'un blanc

vuil wit, de Mond met vier Baardsprietjes en twee Nypers voorzien, de Oogen zyn klein, rond en bruinagtig paarfch, de Kop is Eyrond op 't midden met twee en agterwaarts met zes opwaardsstaande fcherpe bruine doornen voorzien, welke aan de voorgefelde Nymph ontbreeken: om zig een duidelyker denkbeeld der gedaante van dezen kop en de plaatzing der gedachte doornen te vormen, zo heb ik den zelve hier by Fig. 65. A. door het vergrootglas doen afbeelden. Het Borstftuk bestaat uit twee duidelyke te onderscheiden ftukken, welke zo breed als het Agterlyf zyn, het tweede ftuk heeft aan de zyden verheven randen en is gelyk het geheele Infeet van eene bruine kleur: De fchenkels der voorfte Pooten zyn ongemeen breed, plat en aan de zyden als uitgefneeden, de Scheenbeenen hairig en met vyf leden aan de voeten; de Schenkels der vier andere Pooten zyn minder breed, doch ook met uitgefneeden randen. De lederagtige dekschilden hebben eene vuilgroene kleur, maar aan de punten of tippen zyn ze purperkleurig en geheel lederagtig; de buitenranden der Vleugels zyn ook lederagtig met bruin gewolkt en aan de punten met de gemelde purperkleur gefierd, doch het overige dezer vleugels, welk in den rustenden ftand plat over het Agterlyf geplaatst en waaijeragtig geplooit zynde, niet duidelyk genoeg kunnende gezien worden, heb ik dezelve hier uitgebreid vertoond, en de ploojen door de breede donkere overlangse streepen

sâle, la Bouche munie de quatre Barbillons & deux mâchoires, les Yeux sont petits, ronds, d'un Lilas brunâtre, la tête est ovale, fournie de deux épines aigues au milieu & sur le derriere de la tête de six semblables épines élevées en haut, qui manquent à la Nymph mentionnée; pour se former une idée plus distincte de la forme de cette Tête & de l'emplacement des dites épines. Je les ai fait peindre ici Fig. 65. A. par le moyen d'un Microscope. Le Corcelet en deux parties clairement distinctives, qui sont aussi Larges que l'abdomen, la seconde parties a sur les côtés des bords élevés, & est comme tout l'Insecte de couleur brune. Les cuissés des pattes dedevant sont extraordinairement larges, plattes & sur les côtés comme échancrées, les Jambes poilues & cinq articles aux tarses; les Cuissés des quatre autres pattes sont moins larges, mais cependant avec des bords échancrés. Les Elytres vélineux ont une couleur jaune sâle, mais sur les pointes où extrémités sont de couleur pourpre & tous vélineux; les bords extérieurs des ailes sont aussi vélineux nuancés brun & aux pointes ornés de couleur pourpre; mais le reste de ces ailes, qui dans l'état de repos, est situé à plat sur l'abdomen, plissé en évantail, ne pouvant être vu assez clairement, je les ai ici représentées déployées, & les plis sont désignés par des larges rayes obscures de haut en bas, comme les petits par de petites rayes diagonales ondées couleur de Lilas, dont ces grandes ailes sont ornées. Cet Insecte est de l'Île Molluque d'Amboine & gît avec les trois sortes de Mantes qui suivent dans le magnifique
aan-



65



66



67



65. A.



68

aangewezen, als mede de kleine golvwyze dwarsstreepen en de paarsche grondkleur waar mede deze groote vleugels zyn gesierd. Dit Insect is van het Mollukksche Eyland *Amboina* en berust met de drie volgende zoorten der Wandelende Bladen in het voortreffelyke Kabinet van Natuurlyke zeldzaamheden, van den Hoogwelgeb. Heere RAYE VAN BREUKELERWAERTH.

Fig. 66. HET ROOD EN WITGEOOGDE WANDELENDE BLADT.

(van 't 1^{ste} Gezin.)

Heeft zwarte draadvormige Sprieten, den Kop effen en glad, de Oogen bleek groen, gelyk het Borststuk en den lederagtigen buitenrand der dekschilden, Het Borststuk is in 't midden verheven, kielvormig en gerand; het Agterlyf heeft gelyk de Pooten, eene bruin geele kleur met drie bruine dwarsstreepen; de vangpooten zyn met zwarte doornen gewapent en hebben eenen bruinen vlak aan de binnenzijde van den Schenkel. Op het midden der Dekschilden is een roozenroode en een witte vlak, welke te zamen genomen nagenoeg de gedaante van een Oog hebben, het overige der Dekschilden is nevens de Vleugels helder doorschynend. Het is een Wyfje 't welk aan de *Kaap de goede Hoop* is gevonden.

Fig. 67. HET BLADERPootIGE WANDELENDE BLADT.

(van 't 1^{ste} Gezin.)

De Sprieten zyn kort en draadvormig, de kop heeft van boven eene

Cabinet de raretés naturelle de Messire RAYE DE BREUKELERWAERTH.

Fig. 66. LA MANTE AUX YEUX ROUGES ET BLANCS.

(de la 1^{re} Famille.)

A les Antennes filiformes noires, la Tête tout a fait unie, les Yeux verts pâles, de même le Corcelet & le bord extérieur des Elytres vélineux. Le Corcelet est élevé dans le milieu, quillé & borde. L'Abdomen ainsi que les pattes à une couleur d'un jaune brun avec trois rayes brunes diagonales. Les Griffes sont armées d'épines noires & ont une tache brune au côté de dedans de la Cuisse. Sur le milieu des Elytres est une tache d'un rouge rosé & blanc, qui considérée à loisir a la forme d'un œil, le reste des Elytres est comme les ailes transparent clair. Celle-ci est une Femelle, qui a été trouvée au Cap de Bonne Espérance.

Fig. 67. LA MANTE AUX PIÈS. FEUILLÉS.

(de la 1^{re} Famille.)

Les Antennes sont courtes en filiforme, la Tête a en dessus un point aigu, & Scherpe

Scherpe punt en is nevens het geheele Lyf en de Pooten bruingeel; de vangpooten zyn met donkerbruine ringen getekend en met zwarte doornen gewapend; de middelpooten zyn glad en effen, doch de agtersten hebben aan 't einde van den schenkel een hartvormig bladerig vlies en byna in 't midden aan het Scheenbeen een dergelyk vlies. De Dekschilden zyn groen en met witte dwarsstreepen getekend en lederagtig, de vleugels aan de randen bruin, voorts wit en doorschynend. Het is een Mannetje en uit *Bengalen*.

Fig. 68. HET GEBANDEERDE WANDELLENDE BLADT.

(van 't 1^{ste}. Gezin.)

Heeft draadvormige Sprieten, een gladden platten Kop, de Oogen gelyk twee ronde kraalen ter zyde van den Kop; het Borststuk is op het midden kielvormig, gerand en nevens het Agterlyf en Pooten bruingeel, de Vangpooten hebben scherpe doornen. De buitenrand der Dekschilden is strookleurig en lederagtig, voorts wit en doorschynend, de Vleugels hebben ook eenen bruinagtigen buitenrand, op het midden eenen breedden paarschkleurigen dwarsband en smalle streepen van dezelfde kleur op den witten doorschynenden grond. Het voorwerp 't geen wy hier afgebeeld hebben is een Mannetje en was in *Surinamen* gevonden.

comme tout le Corps & les pattes, est d'un jaune brun. Les Griffes sont marquées avec des anneaux bruns foncés & armées d'épines noires, les pattes du milieu sont tout unies, mais celles de derrière ont à l'extrémité des cuisses une Membrane semblable. Les Elytres sont verts, marqués de rayes blanches diagonales & vélineux. Les Ailes brunes sur les bords, & au reste blanches & transparentes. Cette Mante est un mâle venu de Bengale.

Fig. 68. LA MANTE BANDE-ROLLÉE

(de la 1^{re}. Famille.)

A les Antennes filiformes, la Tête unie platte, les Yeux semblables à deux grains, de chapelet aux côtés de la Tête; le Corcelet est en forme de quille sur le milieu, bordé & comme l'Abdomen & les pattes d'un jaune brun. Les Griffes ont des Epines aiguës. Le côté extérieur des Elytres est couleur de paille & vélineux du reste blanc & transparent, les ailes ont aussi un bord extérieur brun, sur le milieu une bande large couleur Lilas diagonale & une raye étroite de la même couleur, sur un fond blanc transparent. L'objet, que nous avons représenté ici est un mâle, qui fut trouvé à Surinam.



Fig. 69. DE GEPURPERDE GEELBAND.

*Van 't Geslagt der Wandelende Bladen.**(van 't Eerste Gezin.)*

Dit Wandelend Blad is kort van Lyf en breed gevleugeld. Het heeft zeer kleine dunne Sprieten op den Kop die met groote Oogen praalt. Het Borststuk is nagenoeg van gelyke breedte, bruin met geelachtige Streepen: de Vangpooten zyn bleek; het Agterlyf is graauw geringd, aan 't end witachtig. De Dekschilden zyn groot en van een schoone purperkleur: de Vleugels aan den voorkant als met geel geborduurd, zyn aan den agterkant donker, in 't midden fraay geel gebandeerd. Het heeft zyn afkomst uit Oostindie.

Fig. 70. HET KLEINE DONKERE WANDELEND BLAD.

(van 't Eerste Gezin.)

Dit heeft wel eenige zweem naar dat van Fig. 10, het kleine bruine Wandelend Blad genaamd, te meer, om dat het ook van Suriname afkomstig is; maar verschilt aanmerkelyk, doordien het zwartachtig graauw is en de Dekschilden bont gevlaakt heeft, de Wieken met kleine witte Streepjes. Het is ook een weinig kleiner, doch de gestalte komt taamelyk overeen.

Fig 69. LA POURPRÉE A BANDE JAUNE.

Du genre des Mantes.

(de la premiere Famille.)

Cette Mante a le Corps court & les Ailes larges. Elle est pourvue d'Antennes petites & minces sur la Tête, laquelle brille par des Yeux très-grands. Le Corcelet est à-peu-près d'égale largeur partout, brun avec des rayes jaunâtres: les Griffes sont pales; l'Abdomen a anneaux gris foncé, blanchâtre au bout. Les Elytres sont grandes, d'une belle couleur de pourpre; les Ailes, au bord antérieur comme brodées de jaune, sont noirâtres dans la partie postérieure & au milieu joliment ornées d'une bande jaune. Elle est originaire des grands Indes.

Fig. 70. LA MANTE PETITE SOMBRE.

(de la premiere Famille.)

Celle-ci ressemble bien en quelque façon, au Mante de la Fig. 10, nommée la petite Mante brune, d'autant plus, qu'elle est apportée aussi de Surinam; mais elle en diffère remarquablement, par sa couleur grise noirâtre & parceque les Etais sont marbrés par des taches; les Ailes ornées des petites rayes blanches. Elle est aussi un peu plus petites, mais la stature convient passablement.

58 BESCHRYVING

Fig. 71. HET KLEINVLEUGELIGE
DUNLYF.

(van 't Tweede Gezin.)

Onder alle de voorgaande Wandelende Bladen is 'er geen, dat in die beide opzigten met het in deeze Figuur afgebeelde strookt. Fig. 28, genaamd *de Purpere Weerschyn*, zou in gestalte het naaste zyn; maar dat heeft de Vleugels veel grooter. Wie, echter, zal bepalen, wat de Sexe in deezē kan uitvoeren; te meer, daar de tegenwoordige ook eenige dergelyke Vlakjes heeft, en insgelyks in Suriname woont. Het Lyf is, gelyk de *Scherminkelen* gelykende. De Dekschilden zyn, even als de Wieken, zeer klein en het overige ontdekt zig genoegzaam uit de Afbeelding.

Fig. 72. HET OLYFBLADIGE WAN-
DELEND BLAD.

(van 't Eerste Gezin.)

De Gestalte van dit Insekt gelykt veel naar die van Fig. 62 en 63, welke, om zeker postuur, het *Biddende en Wegwyzende Wandelend Blad* getyteld zyn; des men dit het *Omarmende* zou kunnen noemen. Ook zou het tegenwoordige met immer zo veel, ja met meer regt, dan dat van Fig. 31, de *Dikbuik* kunnen heeten. Ook blykt dat hetzelfde een Wyfje is. Wy hebben het, naar de uitsteekende figuur en kleur der Dekschilden, *Olyfbladig*

DESCRIPTION

Fig. 71. LA CORPS MINCE A
AILES PENZES.

(de la seconde Famille.)

Entre tous les Mantès précédens, il n'y a pas aucune, laquelle dans ces deux respects convienne avec la desfinée dans cette Figure. La Mante de Fig. 28, nommée le Reluisant pourpre, en approcheroit le plus en stature, mais elle a les Ailes beaucoup plus grandes. Qui, pourtant déterminera, quant la Sexe ici peut effectuer: d'autant plus, que la présente est aussi pourvue de quelques petites tâches semblables & se trouve de même à Surinam. Le Corps est grêlé comme toute la stature, ressemblant à celle des Escogriffes. Les Etuis comme les Ailes, sont très-petites & tout l'autre se montre assez dans la Figure.

Fig. 72. LA MANTE A FEUILLES
D'OLIVIER.

(de la premiere Famille.)

Cet Insecte rassemble en stature beaucoup à la Mantès de Fig. 62 & 63, lesquelles, à raison de quelque posture, sont entirées la Mante devote & indique-voye, & de la même façon, on pourroit nommer celle-ci l'Embrasfante. Aussi la présente pourroit à la même, & peut-être à plus juste raison, porter le nom de Gros-Ventre, comme celle de la Fig. 31. Et il en paroît, qu'elle est une Femelle. A cause de la figure & couleur excellente des Etuis, nous l'avons nommé la Mante à feuilles d'O-



genoemd. Het heeft de Vleugels doorschynende; het Lyf uit den bruinen geelachtig, en komt voor 't overige met de eerstgemelde taamelyk overeen.

In het uitmuntende Kabinet van den Wel Edelen Heer RAYE VAN BREUKELERWAERT, bevindt zig dit zo wel als de overigen van deeze Plaat.

P L A A T XX.

Fig. 73. HET GESTIPPELDE WANDELEND BLAD.

(van het Eerste Gezin.)

De zwarte Stippen, die 'er op ieder Vleugel vyf zyn en de twee zwarte Vlakjes op ieder Dekschild, onderscheiden dit Wandelend Blad genoegzaam van de voorgaanden, in Fig. 64 en 66 afgebeeld. Het is ook in Gestalte en Kleur daar van aanmerkelyk verschillende. Het Lighaam ziet bruinachtig, zo wel als de Vangpooten; de Dekschilden zyn Glasachtig dun met een geelen weerschyn en een groenen rand, zo wel als de Wieken. Het zal, gelyk het volgende van Amboina afkomstig zyn.

Fig. 74. HET ZWARTGATJE.

(van het Eerste Gezin.)

Hoewel dit mede tot de Bladerpootige Wandelende Bladen, Fig. 67, behoort, is het nogthans, in verscheide opzigten, daar van verschillende. De Voorpooten zyn hier dubbeld, de Agter-

d'Olivier. Elle a les Ailes transparentes, le Corps brun jaunatre, & convient pour le reste passablement avec les premierement citées.

Cette Mante, aussi bien que tous les autres de cette Planche, se trouve dans le magnifique Cabinet de Monsieur le Baron RAYE DE BREUKELERWAERT.

P L A N C H E XX.

Fig. 73. LA MANTE POINTILLÉE.

(de la premiere Famille.)

Les pointes noires, dont il y a cinq sur chaque Aile & les deux marques noires sur chaque Etui, distinguent assez cette Mante des précédentes, qui sont dessinées dans les Fig. 64 & 66. Elle en diffère aussi beaucoup en Posture & en Couleur. Le Corps paroît brunatre, aussi bien que les Griffes; les Etuis minces & transparentes ont un teint jaunatre reluisant & un rebord verd, comme les Ailes de même. Elle, aussi bien que la suivante, sera originaire de l'Isle d'Ambon.

Fig. 74. LA PETITE FESSE-NOIRE.

(de la premiere Famille.)

Bienque celle-ci appartienne aussi aux Mantas a Pattes feuilletées, Fig. 67, elle en diffère pourtant en beaucoup d'égards. Les Pattes antérieures sont ici doublement, les postérieures simplement feuil-

pooten enkeld gebladerd. Ook heeft het de Dekschilden flegts groen gerand. De Gepluimde Sprieten onderscheiden het, buitendien, aanmerkelyk. En, alzo het van dezelfde afkomst is, zou men mogen vermoeden, of het ook het Mannetje ware van het naast voorgaande.

Fig. 75. DE GLAS-VLERK.

(van het Eerste Gezin.)

Onder alle de voorheen beschreevene en tot nog toe bekende Wandelende Bladen, is 'er geen, dat de Wieken zo Glasachtig heeft als dit. 't Is waar, het heeft eenen groenen weerschyn, en is eenigermate groen geribd, doch niet groen gerand, gelyk dat van Fig. 19. Ook overtreft het, in grootte des Lighaams allen die tot dit Geslacht behooren, zo veel wy 'er kennen, en in uitgebreidheid der Wieken, die zes Duim uitslaan, alle onze Wandelende Bladen. De Kop, het Borststuk, de Vangpooten en het Agterlyf, zyn anders gelyk in de gemelden. Aan 't end van 't Agterlyf is blykbaar, dat het een Mannetje zy. Wat de afkomst aangaat, die word my verzekerd uit Amerika te zyn, door den Wel Ed. Heer RAYE VAN BREUKELERWAERT, in wiens beroemde Verzameling zig dit, onder den zeer gepasten naam *Hyalina*, zo wel als de beide voorgaanden, bevindt (*).

(*) Zy komt echter met de *Mantis Hyalina* van den Heer FABRICIUS, volgens de bepaling, niet volkomen overeen.

lettées. En outre les Etais sont seulement marginez en verd. Encore est elle remarquablement distinguée, par les Antennes en plume. Et, comme elle est originaire du même pays, on pourroit soupçonner, qu'elle peut-être sera le Mâle de la précédente.

Fig. 75. LA MANTE A AILES
COMME DE VERRE.

(de la seconde Famille.)

Entre tous les Mantes auparavant décrites & qui nous sont connues jusqu'à présent, il n'y a pas aucune, dont les Ailes ressemblent autant en Verre. Elle a, c'est vrai, & une apparence des Côtes vertes, mais pas un rebord verd, comme la Mante de la Fig. 19. Aussi surpasse elle en grandeur du Corps toutes celles qui appartiennent une Mantes devotes, que nous connoissons, & par l'étendue des Ailes, qui ont un vol de six pouces, tous nos Mantes. La tête, le Corcelet, les Griffes & l'Abdomen, d'ailleurs conviennent avec ceux des surnommées. On distingue clairement un bout du Corps, qu'elle est une Male. Quelle vient d'Amérique, m'est assuré par le très-honorable Monsieur le Baron RAYE DE BREUKELERWAERT, dans son Collection très-renommée elle se trouve, sous le nom convenable de *Hyaline*, aussi bien que les deux précédentes.

Fig.

Fig. 76. HET DONKERBRUINE ZWART
GESPIEGELDE SPOOK.

(van 't Eerste Gezin.)

Wy hebben voorheen twee *zwarte* of *zwartachtige* Spookten, het eene van Suriname, het andere van Tranquebar afkomstig, in Fig. 36 en 37 afgebeeld. Die scheenen, hoe zeer in Landoord vervreemd, naauwlyks dan in Sexe te verschillen. Het tegenwoordige heeft ook juist eene zelfde Gestalte, doch is van Kleur slegts donker bruin en veel grooter dan die, zynde bovendien zwart gespiegeld, dat de Dekschildjes zullen zyn. Het munt door zyne geele Sprieten byzonder uit en heeft aan 't end van 't Agterlyf de tekens der Sexe zeer blykbaar. Buiten twyfel zal het van Ambon afkomstig zyn, hebbende zig in de ryke Verzameling van den Heer HOLTTHUIZEN bevonden.

P L A A T XXI.

Fig. 77. HET KLEINVLEUGELIGE
SPOOK.

(van 't Eerste Gezin.)

Dit Insekt behoort buiten twyfel tot het Ras van die ontzaglyk groote Ambonse Spookten, waar van de Afbeelding op de twee eerste Platen van dit Werk, onder den tytel van *de Reus*, is gegeven. Het geheele postuur, naamelyk, wist zulks aan, inzonderheid het dikke rolronde Lyf, weshalve het tot die van 't Eerste Gezin behoort, hoewel de Voorpooten zekerlyk hier, zo wel als in die *Reus*, of in het

Fig. 76. LE SPECTRE BRUN SOMBRE,
A MIROIRS NOIRS.

(de la premiere Famille.)

*Auparavant nous avons fait des-
igner deux Spectres noirs ou noirâtres,
l'un de Surinam, l'autre de Tranquebar;
dans les Fig. 36 & 37. Ceux-ci, combien
éloignées en demeure, paroissent à peine
différens que par le Sexe. Le présent a
aussi la même posture, mais est seulement
de couleur brun sombre & beaucoup plus
grand; ayant en outre des miroirs noirs,
lesquels sans doute sont les Etais. Les
Antennes jaunes le font briller considéra-
blement, & au-bout du Corps les caracte-
res du Sexe sont très-distinctibles. On ne
peut pas douter, qu'il soit originair de
l'Isle d'Ambon, & il s'a trouvé dans la
riche Collection de Monsieur HOLTTHUI-
ZEN.*

P L A N C H E XXI.

Fig. 77. LE SPECTRE A AILES
PETITES.

(de la premiere Famille.)

*Cet Insecte appartient, sans doute, à la
Race de ces extrêmement grandes Spectres
d'Ambon, dont la représentation est donnée
sur les deux premières Planches de cet Ou-
vrage, sous le titre de la Geant. Toute
la posture démontre cela; spécialement le
Corps épais cylindrique; c'est pourquoi il
est référé à la premiere Famille, non ob-
stant que les Pattes antérieures ici, certai-
nement, comme aussi dans le Geant sus-
dit, & dans le Spectre verd, de la
Groena*

Groene Spook Fig. 20, niet langer dan de Agterpooten zyn. De kleinte des Lighaams niet alleen, maar inzonderheid die der Vleugelen en Dekschilden, welke Violetkleurig zyn, onderscheidt het zeer aanmerkelyk en zou byna doen denken, of het zig ook nog in de Staat van *Nymph* bevonden had. Het zal een Mannetje zyn, waarschylyk ook van Amboina afkomstig.

Fig. 78. HET GESPRENKEDELDE SPOOK.

(van 't Eerste Gezin.)

Naar de Gestalte van dat Ambonse Spook, 't welk *Bontvleugelig* genoemd werdt, in Fig. 11. vertoond, zweemt dit, hoewel het veel kleiner is, aanmerkelyk. Het komt, in dat opzigt, ook taamelyk overeen met dat Surinaamse *Bonte Spook* van Fig. 26, uit myne Verzameling afgebeeld (*). Maar de zoom der Wieken, die tot bedekking derzelve wanneer zy samengevouwen zyn, strekt, is hier op een rosachtigen grónd, met kleine bruine Vlakjes als gesprenkeld. De Sprieten zyn zeer lang en dun, ja langer dan het Lyf; 't welk zeer zeldzaam is onder de Spooken. Het tegenwoordige zal, naar alle gedagten, ook van Ambon afkomstig zyn, en heeft zig, zo wel als 't voorige, in 't Kabinet van den Heer HOLTHUIZEN bevonden.

Fig. 20, ne sont pas plus longues, que les posterieures. La petitesse du Corps, non seulement, mais principalement celle des Ailes & les Etais, qui sont de couleur Violette, le distingue remarquablement & feroit presque penser, qu'il s'avoit trouvé dans l'état de Nymphé. Il sera un Male, vraisemblablement aussi originair d'Ambon.

Fig. 78. LE SPECTRE MOUCHETÉ.

(de la premiere Famille.)

Celui-ci ressemble remarquablement a ce Spectre d'Ambon, qui est nommé le Spectre a Ailes tachetées, dessiné dans la Fig. 11; bienque étant beaucoup plus petit: Il convient, en cela, aussi passablement avec ce Spectre marqueté, dessiné de ma Collection dans la Fig. 26. Mais le rebord des Ailes, lequel s'est a les recouvrir, quand elles sont pliées ensemble, ici, sur un fond roussatre, est comme moucheté de petites Taches brunes. Les Antennes sont extrêmement longs & minces; ou plus longues que le Corps; chose qui est très rare chez les Spectres. Le présent sera, sans doute, aussi apporté de l'Isle d'Ambon, & s'a trouvé, aussi bien que le précédente, dans la Collection de Monsieur HOLTHUIZEN.

Fig.

(*) De kundige en vermaarde Heer STOLL, na het bezorgen van vier Uitgaven deezes Werks, naamelyk drie van de Spooken en Wandelende Bladen Pl. I—XVIII; en een van de Sabel-Springhaanen Pl. I—VI, overleeden zynde, heb ik, Doctor M. HOUTTUXN, dit Werk, ten dienste der Liefhebbers gaan vervolgen.



Fig. 79. HET ORANJE-VLAKKIGE
GEHOORND E PODAGRA-BLAD.

(van 't Eerste Gezin.)

Op Pl. XVII. is een Voorwerp van dit Ras van Wandelende Bladen, die men, wegens een Vliesachtig uitwas aan de Pooten, 't *Podagra-Blad* noemt, in Fig. 58 en 59 voorgesteld. Het tegenwoordige onderscheidt zig, zo door de grootte der Vleugelen, als in andere opzigten, aanmerkelyk daarvan. De Oranjekleurige Vlakken versieren 't zelve ongemeen en steeken zeer uit by het groen der Dekschilden. Het Agterlyf, donker bruin, is op de zyden als gedoornd. De Sprieten munten hier zo wel in kleinte uit, als by het voorgaande Insekt in grootte. De Kop is op een byzondere manier gehoornd. Voor 't overige is dit, in alle opzigten, een zeer aardig Voorwerp, zig in het uitmuntende Kabinet van meergemelden Heer RAYE bevindende (*).

Fig. 80. HET KNIELLENDE WAN-
DELEND BLAD.

(van 't Eerste Gezin.)

Tot dat Ras van Wandelende Bladen, welke men, wegens een zekere houding, *Bidders* of *Biddertjes* gewoon is te noemen, behoort zekerlyk het tegenwoordige, en verdient meer dien

Fig. 79. LA MANTE GOUTTEUSE COR-
NUE, A TACHES D'ORANGE.

(de la premiere Famille.)

Sur la Planche XVII. il est représenté un Objet de cette Race des Mantes, qu'on nomme Goutteses, a cause d'une excrescence membraneux aux Pattes, dans les Fig. 58 & 59. Celui de la Figure présenté s'en distingue remarquablement; autant par la grandeur des Ailes, qu'en autres égards. Les Taches de couleur Orangée le font extrêmement brillers, & éclairent joyliment le verd des Euis, l'Abdomen, qui est brun foncé, a comme des épines aux côtés. Les Antennes excellent ici autant par leur petitesse, que dans le précédente par leur longueur. La Tête est corné d'une singuliere façon. Au reste celui-ci est, dans tous les égards, un Objet très-rare, se trouvant dans la Collection de Monsieur RAYE, plusieurs fois citée.

Fig. 80. LA MANTE RELI-
GIEUSE.

(de la premiere Famille.)

A la Race de ces Mantes, auxquelles on, a cause d'une posture singuliere est accoutume de donner le nom de Prega-Dios ou Preche-Dieu, appartient certainement la présente, & mérite plus se titre, que
naam

(*) Het behoort zekerlyk tot de *Mantes Gongyodes* van den heroemden LINNÆUS, waar van ik onder den naam van *Podagra-Scherminkel* in myne *Natuurlyke Historie*, I. D. X. Stuk, blad. 143, eene uitvoerige beschryving, volgens den gemelden Ridder gaf.

naam, dan het gene, waar van bl. 51, zo omftandig, onder den tytel van *Biddende Wandelend Blad*, is gefproken. Het komt volmaakt overeen, met die Soort, welke de Ridder LINNÆUS *Mantes religiosa* genoemd had, volgens zyn Ed. in Afrika als ook in Oostenryk huisvestende (*). Ten minfte waren die, met ongevlakte groene Vlerken, aldaar gevonden. Het hier afgebeelde hebben wy uit Suriname bekomen. In Europa vallen dergelyke, (om dit hier eens te melden,) die kleiner, doch van dergelyke Gestalte zyn, hebbende echter de Vlerken minder groen. De Dekfchilden zyn hier naauwlyks in hoedanigheid van 'de Wicken te onderscheiden (†).

celle, dont auparavant, au page 51, est parlé largement sous le nom de la Mante dévote. Elle convient parfaitement avec l'Espece, que Monsieur LINNÆUS a proposé sous le nom de *Mantes religiosa*, demeurant selon lui en Afrique & aussi en Autriche. Au moins celles-ci avec des *Etais vertes* sans aucune tache, étoient trouvées la. La ici dessinée nous avons reçue le Surinam. En Europe se trouvent de semblables (pour en faire mention cette fois,) qui sont moindres, mais de la même posture ayant pourtant les Ailes moins vertes. A peine peut on les ici distinguer des *Etais* en qualité.

P L A A T XXII.

P L A N C H E XXII.

Fig. 81. DE MAGERE SCHERMINKEL.

Fig. 81. L'ESCOGRIFFE MAIGRE.

(van 't Eerste Gezin.)

(de la premiere Famille.)

Onder de Spooken, die men *Scherminkels* of *Wandelende Stokjes* noemt, waar van hier voor op Pl. XIII, XIV, XV, eenigen, aanmerkelyk verschillende, voorgesteld zyn, munt deeze ongemeen in dunte uit, zo dat men ze te regt *Linearis* kan noemen. Het Lichaam, naamlyk, is overal byna

Entre les Spectres, qu'on nomme Escogriffes ou Fluëts, dont ci avant sur les Planches XIII, XIV & XV, quelques-uns remarquablement différens, ont été représentés, celui-ci se distingue extrêmement par le moindre épaisseur; c'est pourquoi on le peut nommer justement *Linearis*. Le Corps est partout à peu-près également even

(*) Wylen de Heer STOLL schynt niet opgemerkt te hebben, bladz. 52, dat LINNÆUS niet van de *Mantes Precaria*, met Roestviakkige Vlerken, maar van deeze *Mantes religiosa* met groene ongevlakte Vlerken gezegd had, dat die in Afrika en in Oostenryk was waargenomen.

(†) Men kan van dit laatste verzekerd zyn, zo uit de aangehaalde Afbeeldingen, by den Heer FABRICIUS, die van de *Mantes Oratoria* en *religiosa* ééne Soort maakt, als uit de beschryving, welke ik in 't breede, in myne *Natuurlyke Historie*, als boven bladz. 145 enz., van het *Duitsch Wandelend Blad* heb gegeven.

82

83

81

84



even smal; de Pooten zyn byna Draadachtig dun en ongemeen lang, zo wel als de Sprieten: des men het Insekt met meer recht als dat van Fig. 57, ook een Geraamte of Scelet zou kunnen heeten. Voorts heeft het niets dat zig onderscheidt, zynde rosachtig van Kleur (*). Ik heb 'er zodanig één in myne Verzameling gehad. Het tegenwoordige, van 't Eiland Antigoa in de Westindiën afkomstig, is, zo wel als alle die op de twee volgende Platen afgebeeld zyn, uit het aanzienlyke Kabinet van den Wel Ed. Heer RAYE VAN BREUKELERWAERT, te Amsterdam berustende, getekend.

Fig. 82. HET BRUINE WANDEL-
LEND BLAD.

(van 't Eerste Gezin)

Zeer verschilt dit van de andere Wandelende Bladen door zyne Kleur, die in de meesten groen of geelachtig is, uitgenomen in 't zogenaamde *Verdorde Blad*, Pl. IV. Fig. 14, dat een geheel andere Gestalte heeft, zo wel als dat van Fig. 10, het *kleine bruine Wandelende Blad* genaamd. Het ziet over 't geheel uit den bruinen, en heeft alleenlyk de randen der Dekschilden groen. De Wieken zyn by het Lighaam met donkere Vlakken en Vlakjes gesprenkeld. Voor 't overige vind

étroit: les Pattes sont presque minces comme des Fils extrêmement longs, comme aussi les Antennes; c'est pourquoi que l'on pourroit nommer cet Insect, avec plus de raison que celui de Fig. 57, une Squelette. En outre il n'y a rien, qui le distingue, étant partout de couleur roussâtre. J'en ai eu un tel dans ma Collection. Le présent originair de l'Isle Antigoa de l'Amérique, est dessiné, comme tous ceux qui sont représenter sur les deux Planches suivantes, du Cabinet excellent du très-honorable Monsieur le Baron RAYE DE BREUKELERWAERT, dans la Ville d'Amsterdam.

Fig. 82. LA MANTE BRUNE.

(de la premiere Famille.)

Cette Mante differe beaucoup des autres par sa Couleur, qui dans le pluspart des Mantes est verdâtre ou jaunâtre, horsmis dans la Mante nommée Feuille deséchée, Fig. 14. Plaat IV. laquelle est d'une forme tout à fait différente; comme aussi celle de la Fig. 10, intitulée la petite Mante brune. Celui-ci est partout au brunâtre, & les bords des Euis seulement vertes. Les Ailes proche le Corps sont marquetéz par des taches obscures grandes & petites. Au reste je ne trouve rien de singulier dans cet Objet, qui étant originair des grands

ik

(*) Alzo deeze Spook niets heeft, dat naar Wieken of Dekschilden gelykt, zal het waarschyntlyk een *Pop* of *Nymph* zyn. Men vindt 'er verscheidene, van dien aart, in 't Werk van SEBA afgebeeld, en ik heb van deeze Scherminkels, in myne *Natuurlyke Historie* als boven, bl. 139 enz., omstandig gesproken.

ik niets byzonders in dit raare Voorwerp, dat uit Oostindie afkomstig is, zynde uit het Kabinet van den Heer HOLTHUIZEN getekend.

Fig. 83. HET GEELE ZWAARLYVIGE WANDELEND BLAD.

(van 't Eerste Gezin.)

Dit munt by de andere Wandelende Bladen uit, door de grootte van het Agterlyf naar de kleinte van 't geheele Insekt te rekenen. Ook zyn 'er weinigen zo byna geheel geel van Kleur, zonder eenig groen aan de Dekschilden: hoewel het Borststuk en de Vangpooten uit den graauwen zien. Het end van het Agterlyf is helder bruin: de Wieken zyn met geele Vlakjes gesprenkeld. Het komt uit Suriname en bevindt zig in de Verzameling van den Heer RAYE; meer gemeld.

Fig. 84. HET GROENE DWERGJE.

(van 't Eerste Gezin.)

Dit gelykt veel naar 't Geelgerande Dwerdje van Fig. 43, dat echter merkelyk kleiner is en van de Kaap de Goede Hope afkomstig. Het tegenwoordige, de Wieken byna geheel groen, met een geelachtige weerschyn hebbende, valt in Suriname. Het heeft by de gewoone Wandelende Bladen, die tot de zogenaamde Biddertjes behooren, weinig byzonders.

Indes, à été desiné du Cabinet de Monsieur HOLTHUIZEN.

Fig. 83. LA MANTE JUANE CORPULENTE.

(de la premiere Famille.)

Cette Mante se distingue des autres par la grandeur de son Abdomen, en comparaison à la petitesse de l'Insecte entier. Aussi il y a peu de Mantes, dans lesquelles le jaune domine autant. Sans aucun de verd sur les Etais: bien que le Corcelet & les Griffes ont un teint brunatre. Le bout de l'Abdomen est brun clair: les Ailes sont marquetées par des petites Taches jaunes. Il vient de Surinam & se trouve dans la Collection de Monsieur RAYE, plusieurs fois citée.

Fig. 84. LE NAIN VERDATRE.

(de la premiere Famille.)

Celui-ci ressemble beaucoup au Nain bordé jaune, de la Fig. 43, lequel est pourtant beaucoup plus petit, & originair du Cap de Bonne Esperance. Le present, ayant Ailes presque tout à fait vertes, avec un reluisant jaunatre, se trouve du Surinam. En comparaison avec Mantes vulgaires, appartenant aux Devotes ou Religieuses, elle a peu de Singulier.



Fig. 85. HET NETVLEUGELIGE SPOOK.

(van 't Eerste Gezin)

In 't voorste van dit Werk op Pl. III en IV, is het Mannetje en Wyfje voorgesteld van een *Ambons Spook*, dat in grootte en gestalte veel gelykt naar het *Amerikaanse* van deeze Afbeelding. Het Wyfje nogthans is veel grooter dan dit, 't welk een Wyfje zynde, nogthans daarin meer naar het Mannetje zweemt. De Kleur verschilt zeer weinig, dan, wat de bovenranden der Wieken aangaat, die hier donker bruin en geel gevlaakt zyn. 't Gemelde *Ambonse* was slegts *Bontvleugelig* getyld; dit noem ik, wegens de Netswyze tekening der Wieken, *Netvleugelig*. Het komt, voor 't overige, met dit slag van Spook, die men *Jufferachtig* zou kunnen noemen, om dat zy naar de Libellen veel gelyken, 'hoedanig één op onze Pl. XXI ook vertoond is, taamelyk overeen.

Fig. 86. HET KAPEL-ACHTIG SPOOKJE.

(van het Eerste Gezin)

Deeze Spook, veel kleiner dan de voorgaanden, zweemt dermaate naar dat slag van Kapellen, die *Gestreckte* of *Parnas-Kapellen* heeten, dat men het onverhoeds daar voor zou aanzien. Echter is het, voor een kundigen,

Fig. 85. LE SPECTRE A AILES EN RESEAU.

(de la premiere Famille.)

Sur les Planches III & IV, de cet Ouvrage, sont représentés le Male & la Femelle d'un Spectre d'Ambon, lequel en forme & grandeur, à beaucoup de ressemblance au Spectre Américain, de cette Figure. La Femelle pourtant est beaucoup plus grande que celui-ci, lequel étant aussi une Femelle, à plus report au Male susdit. La Couleur diffère très peu, excepté les rebords des Ailes, les quelles sont tachetées brun sombre & jaune. Le dit Spectre d'Ambon étoit simplement entitré, à Ailes tachetées: Celui je nomme, à cause de la peinture des Ailes en réseau. Il convient, pour le reste, passablement de forme semblable avec cette race des Spectres, que l'on pourroit appellés Libelloïdes, dont il à unre présenté sur notre Planche XXI.

Fig. 86. LE SPECTRE MANIERE DE PAPILLON.

(de la premiere Famille.)

Ce Spectre, beaucoup plus petit que les précédens, ressemble autant à cette race de Papillons, que LINNÆUS à appelé *Parnasins*, qu'on le prendroit à l'improviste pour un tel. Un connoisseur, pourtant, le distingue aisement, autant par la longueur

zeer gemakkelyk daar van te onderscheiden, zo door de langte van het Lyf, als door de kleine Dekschildjes, die half graeuw, half geelachtig zyn. De Wieken zyn ook grootendeels graeuw, met een witte Vlak, en aan den bovenrand fyn geel gestreept: Het Lyf en de Pooten graeuw. Het is een Mannetje, afkomstig uit Suriname (*).

du Corps, que par la petitesse des Etais, lesquelles sont moitié gris brune, moitié jaunâtre. Les Ailes, aussi sont pour la plus grande partie gris brunes, avec une tache blanche, & un rebord finement rayé de jaune. Le Corps & les Pattes sont grises brun. C'est une Male, originair de Surinam.

Fig. 87. DE TOR-ACHTIGE SPOOK.

Fig. 87. LE SPECTRE, AIR D'ES-CARBOT.

(van 't Tweede Gezin.)

(de la seconde Famille.)

Onder de Torren, inzonderheid onder de Agret- en Aardtorren, zyn verscheidene zeer smal van Lyf, naar welken deeze Spook aanmerkelyk in dit postuur gelykt. Zy heeft de Voorpooten korter dan de Agterpooten en is over 't Lyf geel en zwart gestreept, met den Kop vry lang uitsteekende, de Spieren taamelyk lang. De afkomst van deeze en de volgende is uit Nieuw Georgie, in Noord-Amerika.

Entre les Escarbots, spécialement ceux que l'on nomme Buprestes & Carabés, il y a plusieurs d'un Corps très mince auxquelles le Spectre à beaucoup de rapport par sa posture, comme il est ici représenté. Il a les Pattes de devant plus courts, que ceux de derniers, & est sur le Corps rayé jaune & noir, avec la Tête beaucoup étendue; les Antennes passablement longs. Celui-ci, comme aussi le suivant à son origine de la Nouvelle Georgie, ou l'Amérique septentrionale.

Fig. 88. HET KLEINE GESTREEPTE SPOOKJE.

Fig. 88. LE PETIT SPECTRE RAYÉ.

(van het Tweede Gezin.)

(de la seconde Famille.)

Dit munt zeer in kleinte uit, doch

Ce Spectre excelle beaucoup en petitesse, heeft

(*) Men wil, dat het de *Mantis Necdoides* zyn zoude van LINNÆUS, Syst. Nat. Ed. XII. p. 691; doch die verschilt daar van baarblykelyk als hebbende de Dekschildjes groen en uitwaards zwart: maar het gelykt in figuur en grootte zeer naar dat van myne Fig. 26, aldaar het Bonte Spook genaamd, ook uit Suriname, dat wel het Wyfje van deeze zou kunnen zyn.

heeft niettemin de Gestalte byna van de voorgaande, des men het misschien zou mogen houden voor een Mannetje van dat slag van Spookten. Het Lyf is geelachtig rood gestreept; de Pooten en Sprieten hebben ook die Kleur. Deeze beide en de volgende zyn zeer raare Insecten.

Fig. 89. DE BLADER-POOT.

(van het Tweede Gezin.)

Onder de Wandelende Bladen hebben wy verscheidene gezien, met Gebladerde Pooten, doch onder de Spookten is dit zeldzaam. Het tegenwoordige heeft de Dyën t'eenemaal met breede Blaadjes bekleed (*). Het Lyf is zeer breed; de Wieken leggen samengevouwen en gedeeltelyk onder de Dekschilden verborgen. De Kleur is over 't geheel bleek of vuil geel. Ten opzigt van de afkomst kunnen wy niets bepaalen.

P L A A T XXIV.

Fig. 90. DE GETOORENDE SCHERMINKEL.

(van 't Eerste Gezin.)

Het Insekt van deeze Afbeelding maakt eene zo byzondere vertooning onder de Spookten, dat men het met

mais il a pourtant à peu près la forme du précédent; c'est pourquoi qu'on le pourroit peut-être tenir pour un Male de cette race des Spectres. Le Corps est peint avec des rayes d'un roige jaunaetre; les Pattes & les Antennes ont la même couleur. Ces deux comme aussi le suivant, sont des Insectes très rares.

Fig. 89. LA PATTE FUILLETTE.

(de la seconde Famille.)

Entre les Mantes nous avons vu plusieurs, qui avoient des Pattes feuilletées, mais entre les Spectres c'est un phenomene singulier. Le présent a les Cuisses tout à fait vetues de Feuilles larges. Le Corps est très large; les Ailes sont plissées ensemble & en partie couvertes par les Etais. La Couleur est par tout jaune, pale, & terne. Quant à l'origine, nous n'en pouvons pas déterminer.

P L A N C H E XXIV.

Fig. 90. L'ESCOGRIFFE A TOUR.

(de la premiere Famille.)

L'Insecte de cette Figure fait une apparence si singuliere entre les Spectres, qu'on le pourroit appeller, avec raison un Mon-
re

(*) Hier in komt het grootelyk overeen, met de gewoonlyk zogenaamde *Wandelende Blader*, welke echter met recht tot de Spookten betrokken zyn, op Plaat VII. afgebeeld.

reden Monstreus zou mogen noemen. Buiten twyfel behoort hetzelfde tot de Scherminkels, maar alle die voorheen afgebeeld zyn hebben een regelmaatige schikking van het Lighaam en de buiten Leden; hier is alles regt het tegendeel. Het Lighaam is gedraaid; de Kop als een Tooren verheven, met groote uitpuilende Oogen en zeer lange Sprietten. De middelste Pooten zyn uitermaate klein, de voorste zeer lang en de Agterpooten gedoornd: welke laatste zig in geene der Scherminkelen, die, bevoorens in dit Werk afgebeeld zyn, vertoond. De Kleur is roodachtiger dan die der anderen. Deeze is in Suriname gevonden.

Fig. 91. HET GESPELDEWERKTE BIDDEND WANDELLENDE BLAD. (Wyf.)

(van 't Eerste Gezin.)

Tot de Bidders onder de Wandelende Bladen, waar van voorheen gesproken is, behoort dit buiten twyfel, dat zig onderscheidt door het maakzel zyner Wieken, die geweven fyn en als Speldewerk zyn. Haar Zoom alleenlyk is effen en een weinig gestreept, zo wel als de Dekschilden. Buitendien heeft het niets byzonders, uitgenomen, dat de Wieken ronder en korter zyn, dan in veele anderen van dit slag van Wandelende Bladen (*).

stre. Il appartient sans doute aux Escogriffes ou Fluëts, mais tous ceux qui sont dessinés ci devant, ont une régulière disposition du Corps: ici s'est tout à fait contraire. Le Corps est contourné; la Tête élevée comme un Tour, avec des Yeux grandes, débordant, & des Antennes très longues. Les Pattes demilieu sont beaucoup moindres que les autres; les antérieures très-longes & les postérieures épineuses, ce qui ne paroît pas dans aucune autre des Escogriffes, de cette Collection. La Couleur est plus rougeâtre que celle des autres. Il est trouvé en Surinam.

Fig. 91. LA MANTE DEVOTE A DENTELLES. (Femelle.)

(de la première Famille.)

Aux Devotes ou Religieuses, dont nous avons parlé ci devant, appartient sans doute cette Mante, la quelle se distingue par la structure de ses Ailes, qui sont finement travaillées comme en dentelle. Leur rebord seulement est uni & un peu rayé, comme les Etuis. En outre elle n'a rien de singulier, horsmis que les Ailes sont plus arrondies & plus courtes que dans beaucoup d'autres Mantres de cette race.

De

(*) Tot de *Mantis Carolina* van LINNÆUS zou deeze misfchien kunnen behooren.

91

90

92

94

93



De kleur is over 't geheel bruinachtig bleek rood.

La Couleur est partout, rouge, pale, brunatre.

Fig. 92. HET GESPELDEWERKTE BID-
DEND WANDELLENDE BLAD. (Man.)

Fig. 92. LA MANTE DEVOTE A
DENTELLES. (Mâle.)

(van 't Eerste Gezin.)

(de la premiere Famille.)

Het geringe onderscheid tusschen dit en het voorgaande, in Gestalte en Grootte, maakt dat men hetzelfde met reden voor het Mannetje houden kan van 't gemelde Wyfje. Behalven het gelyke maakzel der Wieken, hebben de Dekschilden in beiden ieder een zwarte Stip. De donkere Kleur des Lighaams en de groenachtige der Vlerken maakt het voornaamste verschil uit. Zy zyn beiden uit Nieuw Georgie, of uit Virginie afkomstig.

Il y a si peu de différence dans la forme & grandeur, entre celle & la précédente, qu'on peut avec raison, prendre celui-ci qui est un Male, pour le pair de la précédente, qui est une Femelle. Outre la structure semblable des Ailes, les Etais sont de même marquez par un point noir. La Couleur sombre du Corps & verdâtre des Ailes, fait la principale différence. Elles sont tous deux Originaires de la Nouvelle Georgie, ou Virginie.

Fig. 93. HET DWERGJE MET
GEELE OOG-VLAKKEN.

Fig. 93. LE NAIN TACHE A YEUX
JAUNES.

(van 't Eerste Gezin.)

(de la premiere Famille.)

Dit kleine Wandelend Blad onderscheidt zich duidelyk door de geele zwart gerande Vlakken die als oogen op de Dekschilden zyn, en heeft bovendien de Oogen aan den Kop op een byzondere manier geplaatst. De afkomst is uit die zelfde Gewesten van Amerika.

Des grandes taches jaunes, comme des Yeux, sur les Etuis, caracterisent cette petite Mante, laquelle, en outre, a ses Yeux sur la Tête singulierement disposée. Elle vient aussi de la même Region, de l'Amérique.

Fig. 94. HET WANDELEND BLAD MET
OPGESCHORTE STAART.

(van 't Eerste Gezin.)

Dit Insekt zou tot de *Podagreufe Wandelende Bladen met een gehoornden Kop*, als Fig. 79. behooren, indien het Vleugels, of Dekschilden had, maar het is flegts een Nymph of Pop, of liever een Scelet, dat zig door het opwaards omgekromde Agterlyf onderscheidt.

Alle de Insekten van deeze twee laatste Platen, zyn als te vooren gezegd is, uit de onvergelykelyk schoone Verzameling van den Wel Edelen Heer RAYE getekend.

Fig. 94. LA MANTE A QUEUE
RETROUSSÉE.

(de la premiere Famille.)

Aux Mantes Gouteuses à Tête cour- nue, dont celle de Fig. 79, fait partie, appartiendrait cet Insecte, s'il auroit des Ailes, ou Etais; mais c'est seulement une Nymphe ou Chrysalide, ou plutôt une Squelette, qui se distingue parceque l'Abdomen est singulierement recourbé en haut.

Tous les Insectes de ces deux dernieres Planches, sont dessinées, comme il a été dit, du Cabinet inestimable de Monsieur le Baron RAYE DE BREUKELERWAERT.



P L A A T XXV.

P L A N C H E XXV.

Fig. 95. HET GROOTE GROENE
WANDELEND BLAD.

Fig. 95. LA GRANDE MANTE VERTE.

(van 't Tweede Gezin.)

(De la Seconde Famille.)

De kleur van dit Insect is over het geheele Lichaam groen, de bovenvleugels die naar het Lijf heen in het geel vallen, zijn bovendien, elk met eene bruine vlak getekend, gelijk ook aan de midden der voorpooten te zien is zijnde de vangers van evengemelde kleur, terwijl de onder Vleugels geheel en al met geele vlakken bezet zyn, de lengte van dit dier, te rekenen, van den Kop tot aan het einde van het Lichaam is meer dan drie Duimen, het zelve is berustende in het fraaije Kabinet van den Wel Edelen Heer J. CALKOEN.

Tout le corps de cet Insecte est de couleur verte; ses ailes supérieures qui ont du côté du corps une teinte jaunâtre, sont, outre cela, marquées d'une tache brune, ainsi que le milieu des pattes antérieures. Les ailes inférieures sont entièrement parsemées de points jaunes. La longueur de cet Insecte, à compter de la tête jusqu'au bout postérieur du corps, est de plus de 3 pouces. Il se trouve, ainsi que plusieurs autres objets de notre Planche, dans le Cabinet du célèbre Mr. J. CALKOEN.

Fig. 96. HET KLEINE GROENE
WANDELENDE BLAD.

Fig. 96. LA PETITE MANTE VERTE.

(van 't Tweede Gezin.)

(De la Seconde Famille.)

Deeze is aldus genaamt om de groote gelijkheid aan het bovengemelde voorwerp, doch lichter van kleur zijnde als hetzelfde, ook is dit dier ruim een Duim kleinder, en heeft de bruine vlakken niet, nog op de Vleugels, nog aan de Pooten, en is ook in het bovengemelde Kabinet.

Cet Insecte est ainsi nommé à cause de sa grande ressemblance avec le précédent, il est, cependant, d'une couleur plus pâle; outre cela il en diffère sensiblement, non seulement en ce que l'on n'y trouve aucune tache brune ni sur les pattes, ni sur les ailes; mais, encore, en ce qu'il est considérablement plus petit, puis qu'il a à peu de longueur. On le trouve aussi dans le susdit ne deux pouces Cabinet.

Fig. 97. DE DWERG.

Fig. 97. LE NAIN.

van 't Geslacht der SPOOKEN.

du Genre des SPECTRES.

(en 't Tweede Gezin.)

(De la Seconde Famille.)

In tegenoverstelling van de Reus op Plaat I. in de beschrijving der Spookten aldus genaamd hebbende het tegenwoordig Voorwerp, hoe wel by vergelijking aan hetzelfde in waarheid slechts een Dwergje zijnde, anderzints nog al eenige overeenkomst met dat Insect, zo in maakzel als kleur, uitgenoomen, de kenmerken die het Gezin onderscheiden, en het fraaije van tekening dat bij het eerstgenoemde plaats heeft, ook heeft het diertje zommige kenmerken van de Wandelende Blaaden, hetzelfde is mij ter handgefteld door de Wel Edele Heer RAYE, VAN BREUKELERWAARD in wiens uitmuntende verzameling dit Voorwerp is berustende.

On a appelé cet Insecte le Nain, à cause de sa petitesse, par opposition au Géant de la 1^e. Planche de la Description des Spectres, avec le quel il a de grands rapports de forme et de couleur; hormis, toutefois, les Caractères qui distinguent cette Famille, ainsi que la beauté du dessin qui caractérise le premier. Cet Insecte a quelques uns des Caractères des Feuilles Ambulantes. Il m'a été fourni par Mr RAYE, Baron de BREUKELERWAARD, et se trouve dans son Cabinet.

Fig. 98. DE TWYFFELAAR.

(van 't Tweede Gezin.)

Men zoude dit voorwerp het welk onder den Wel Edelen Heer J. CALKOEN berust, lichtelijk onder de Spookten van het Tweede Gezin rangschikken, als hebbende oppervlakkig meer gedaante en overeenkomst met dezelve dan wel met de Wandelende Bladen, wij schroomen echter niet om hetzelfde onder het Tweede Gezin der Wandelende Bladen te plaatsen, aangezien, de draadvormige Sprieten, benevens de uitpuilende oogen, hiertoe genoegzame kenmerken opleveren behalven het bladachtige der vleugelen die vaal van kleur zijn.

Fig. 99. DE GROENE PAPILLONARIS.

(van 't Tweede Gezin.)

Offchoon ik dit Dier hier plaats als behoorende onder het opgegeevene geslacht, zo is 'er mij in het voorwerp zelve te veel tegenstrijdigheid, dan dat ik zoude willen beweerden, dat hetzelfde goed gerangschikt was, het is mij voorgekomen onder eenige Collectiën waar uit ik veel voorwerpen heb afgetekend, en geef het hier als een plaatsvuller, hetzelfde huisvest aan de Kaap de Goede Hoop.

Fig. 100. DE DIANA.

(van 't Eerste Gezin.)

Het Wandelende Blad bij deelen afgebeeld is getekend naar een uitmuntend voorwerp berustende in het Cabinet van den Wel Edelen Heer J. P. a ROY, ik besluit met de afbeelding en beschrijving van hetzelfde deze verzameling van Spookten en Wandelende Bladen, en zal van dit fraaije Diertje, dat in schoonheid van kleuren boven zo veele anderen uitmunt niets anders zeggen als dat hetzelfde afkomstig is uit de Oost Indiën en voor het overige de Liefhebbers ter verdere naspooring tot de naauwkeurige afbeelding zelve verwijzen.

Fig. 98. LE SCEPTIQUE.

(De la Seconde Famille.)

Cet Insecte ayant plus de rapports de forme avec les Spectres qu'avec les Feuilles Ambulantes, on pourrait sans peine le ranger auprès des Spectres de la première Famille; cependant, je crois devoir le ranger près de ceux de la seconde Famille, à cause de ses antennes filiformes et de ses yeux gros et saillans, caractères, qui joints à ses ailes feuillées et de couleur fauve mé fournissent assez de raisons pour le ranger ainsi. Cet Insecte se trouve dans la Collection de Mr. J. CALKOEN.

Fig. 99. LE PAPILLONNAIRE VERT.

(De la Seconde Famille.)

Quoique je place ici cet Insecte comme appartenant au Genre des Feuilles Ambulantes, je trouve, cependant, dans ses caractères tant de points qui sont en opposition avec ceux de ce Genre, que je n'oserais affirmer s'il est réellement bien placé ici. Toutefois, comme je l'ai trouvé ainsi rangé dans une Collection fameuse, qui m'a procuré plusieurs autres objets à desliner, je le donne ici, seulement, comme remplissage. On ne n sait point d'autres particularités, sinon qu'on le trouve au Cap de Bonne-Espérance.

Fig. 100. LA DIANE.

(De la Première Famille.)

Cette belle Mante est dessinée, ainsi que tous nos autres objets, d'après nature, telle qu'elle se trouve dans le grand et magnifique Cabinet du célèbre Mr. J. P. a ROY. Je termine par cet objet mon Recueil de Spectres et de Feuilles ambulantes. Je me contenterai de dire ici que cet insecte est venu des Indes orientales; je laisse, au reste, aux amateurs le soin et le plaisir de juger, d'après le dessin exact que j'en offre, de sa beauté et de la variété de ses couleurs, en quoi il surpasse plusieurs espèces de son Genre.

Bij het begin van dit Werk, dat fluks gewijze uitgekomen is, beloofden wij in hetzelfde de afbeeldingen en Beschrijvingen te geven, van de Spoken of zoo genaamde Scherminkels, in het Latijn genaamd *Spectrum*, doch welke naam naderhand veranderd is in *Phasma*, vervolgens van de wandelende Bladen, *Mantes*, Zabel-Springhanen, *Gryllis Tettigoniæ*, Krekels, *Gryll: Achetæ*, Trek-Springhanen, *Gryll: Locustæ* en van de Kakkerlakken, *Blattæ*, en waarin wij zoo verre geslaagd zijn dat er zeker maar zeer weinige voorwerpen zullen bekend wezen, waarvan wij de Afbeelding niet hebben medegedeelt, en oordeelen dus dit werk te moeten sluiten, verdeelende hetzelfde in twee Delen, behelzende het Eerste Deel de Afbeeldingen en Beschrijvingen der Spoken en Wandelende Bladen, zijnde een getal van ruim honderd Figuren afgebeeld op vijf-en-twintig Platen; en het tweede Deel behelst de Afbeeldingen en Beschrijvingen van de overige hier boven genoemde Insecten.

Om nu deze onze Arbeid van nog meerder nut te doen zijn, hebben wij hierbij gevoegd een Register van de Spoken en Wandelende Bladen in dit Deel afgebeeld, niet alleen van de Hollandsche en Fransche Benamingen, maar ook van de Latijnsche, welke laatste namen wij naar andere over deze Insecten geschreven hebbende Autheuren, zoo veel ons doenlijk was hebben nagezien, en de voorwerpen welke er geen hadden, zijn door ons

Lorsque nous entreprîmes de publier cet ouvrage, qui a paru par cahiers, nous nous engagions de donner les figures des Spectres, en Latin Spectrum, nom que depuis on a changé en Phasma, des Mantes, des différentes familles de Sauterelles, Gryllus Tettigoniæ, Gryll: Achetæ, Gryll: Locustæ, ainsi que des Blattes. Nous venons d'achever cette tâche au point d'être persuadés que certainement on ne trouvera qu'un très petit nombre d'objets dont nous n'ayons communiqué la figure. Nous croyons donc pouvoir terminer cet ouvrage, en le divisant en deux Tomes, dont le premier contient les figures et les descriptions des Spectres et des Mantes, représentés en au delà de cent figures sur vingt cinq planches; le second Volume contient les figures et les descriptions des autres Familles que nous venons d'indiquer.

Afin de rendre cet ouvrage plus utile, nous avons ajouté une Table des Spectres et des Mantes figurés dans ce Tome; cette Table indique les noms Hollandais, Français et Latins; les noms Latins, sont ou ceux cités par d'autres Auteurs, qui ont écrit sur les Insectes, ou ceux que nous avons choisis nous mêmes. Nous avons cru d'autant plus nécessaire de proposer ces noms, que l'usage devient plus général d'indiquer tous les Insectes par des noms Latins, ainsi nous nous

benoemd, het gene wij oordeelden te meer noodzakelijk te zijn, dewijl nu doch het algemeene gebruik is, alle Insecten zoo veel mogelijk bij de Latijnsche naam te noemen, vertrouwende dat wij hier mede aan de Liefhebberen geen geringe dienst hebben gedaan, en zij met het beschouwen van dit Werk eenig genoeg zullen ondervinden.

flattons que les Amateurs approuveront cette mesure et qu'ils trouveront de la satisfaction dans le contemplation de cet ouvrage.

REGISTER T A B L E I N D E X
V A N D E D E S
IN DIT WERK AFGEBEELDE S P E C T R E S P H A S M A T U M
S P O K E N E T D E S E T
E N F E U I L L E S M A N T U M
WANDELENDE A M B U L A N T E S I N H O C
B L A D E N . Q U I S O N T R E P R E S E N T E S O P E R E D E L I N E A T O R U M .
D A N S C E T O U V R A G E .

SPOKEN, *Eerste Gezin.*

SPECTRES, *Premier Famille.*

PHASMA, *Familia Prima.*

1. De Heug.
2. Het Bontbleugelige.
3. Het Hoodgebleugelde.
4. Het Groene.
5. Het Bonte.
6. De Tweeblaak.
7. Het zwarte Surinaamsche.
8. Een Larva of Nymph.
9. Het Berken Takje.
10. Het gebogen Doozpooten.
11. De Bladerpotige.
12. Het Chineeſe Geraamte.
13. De Aſchkleurige.
14. Het Schoonznde.

Le Géant.
à Ailes tachetées.
à Ailes rouges.
Le Verd.
Le Marqueté.
La double tache.
Le noir de Suriname.
Une Nymphé.
La Branche a Bouillot.
Aux pieds de devant courbes.
Aux pattes feuilletées.
Le Squelette Chinois.
La couleur cendrée.
Le Cornu.

Gigas.	1.	1
	2.	5
Necydaloides	3.	8
	4.	11
Rosea	5.	17
Jamaicensis	6.	20
		21
Variegata	8.	26
Bimaculata	8.	29
Lateralis	10.	36
		37
Nympha	10.	39
Arumatia	13.	51
Curvipes	13.	52
Femorata	14.	54
Simplex	14.	55
Cinerea	14.	56
Bicornis	15.	57
		15.

15.	De donker byzine zwart Ge- spiegelde.	<i>Le brun sombre à Miroir noir.</i>	Bioculata	Tab. Fig. 20. 76
16.	Het Kleinbleugelige.	<i>à Ailes petites.</i>	Angulata	21. 77
17.	Het Gespenkelde.	<i>Le Mouchette.</i>	Acanthophora	21. 78
18.	De magere Scherminkel.	<i>L'Escogrisse maigre.</i>	Filiformis	22. 81
19.	Het Netbleugelige.	<i>à Ailes en réseau.</i>	Reticulata	23. 85
20.	Het Capelachtige.	<i>Maniere de Papillon.</i>	Perispicillaris	23. 86
21.	De Gerooynde.	<i>Le Tour.</i>	Heteropoda	24. 90

Twede Gezin.

Seconde Famille.

Familia Secunda.

1.	Het Dzaakje/ is nog een Lar- va of Nymph.	<i>Le petit Dragon, est encore une Nymphe.</i>	Nympha	5. 18
2.	Het Citzoenblad.	<i>La feuille de Citron.</i>	Siccifolia	7. $\left\{ \begin{array}{l} 24 \\ 25 \\ 26 \end{array} \right.$
3.	De byzine Tweedoozn.	<i>La double Epine brune.</i>	Linearis	8. 27
4.	Het Amboinsche Dzaakje.	<i>Le Dragon d'Amboine.</i>	Flabelliformis	18. 65
5.	De Tozachtige.	<i>Air d'Escarbot.</i>	Buprestoides	23. 87
6.	Het kleine Geszcepte.	<i>La petite raye.</i>	Vermicularis	23. 88
7.	De Bladerpoot.	<i>La patte feuilletée.</i>	Chlorophylla	23. 89
8.	De Dwerf.	<i>Le Nain.</i>	Acicularis	25. 97
9.	De Twijfelaar.	<i>Le Sceptique.</i>	Ambigua	25. 98

WANDELENDE BLADEN,

FEUILLES AMBULANTES,

M A N T E S,

Eerste Gezin.

Premiere Famille.

Familia Prima.

1.	De Glaswiekt.	<i>à Ailes vitrées.</i>	Forficata	1. 2
2.	Het Caapsche Dwerfje.	<i>Le Nain du Cap.</i>	Pusilla	1. 3
3.	Het groene Dwerfje.	<i>Le Nain verd.</i>	Abbreviata	1. 4
4.	Het Duitse Dwerfje.	<i>Le Nain d'Allemagne.</i>	Pagana	2. 6
5.	Het Surinaamsche Dwerfje.	<i>Le Nain de Suriname.</i>	Viridula	2. 7
6.	Het kleine byzine.	<i>La petite brune.</i>	Truncata	3. 10
7.	Het grijze met zwart-geblakte een Nymph.	<i>La grise tachetée de noir, une Nymphe.</i>	Nympha	4. 12
8.	Een Nymph.	<i>Une Nymphe.</i>	Nympha	4. 13
9.	Het byzine verdoorde.	<i>La déséchée brune.</i>	Sinuata	4. 14
10.	Het Coromandels Dwerfje.	<i>Le Nain de Coromandel.</i>	Pagana	4. 15
11.	Het groen Gerande.	<i>La Bordée de verd.</i>	Vitrea	5. 19
12.	Het Geelbleugeligen Nymph.	<i>Aux Ailes jaune, une Nymphe.</i>	Nympha	6. 22
13.	Het byzine Grootgeogde.	<i>Le brune aux gros Yeux.</i>	Oratoria	6. 23
14.	De Kwabpoot.	<i>Le pied Lobatique.</i>	Macroptera	8. 30
15.	De Dikbuik.	<i>Le gros Ventre.</i>	Birivia	9. 31
16.	Het Gerooynde.	<i>La Ceinturée.</i>	Cingulata	9. 32

			Tab. Fig.
17. Het Gehooznde.	<i>La petite Cornue.</i>	Lobata	9. 33
18. De Russische Kamspriet.	<i>Aux antennes Pectinées de la Russie</i>	Pectinicornis	9. 34
19. De Behoeftige.	<i>L'Indigente.</i>	Pauperata	10. 35
20. Het Gespzenkelde.	<i>La Bigarrée.</i>	Striata	10. 40
21. Het gzoote Schilddragende.	<i>Le porte Ecuson.</i>	Cancellata	11. 41
22. Het geelgerande Dwergrse.	<i>Le petit Nain à bord jaune.</i>	Marginalis	11. 42
23. Het Gelzoonde.	<i>La Couronnée.</i>	Bicornis	11. 43
24. Het Kzoppige.	<i>L'Ecouelleuse.</i>	Rhomboidea	11. 44
25. Het Gaasbliegachtige.	<i>Le Hemeroboide.</i>	Fenestrata	12. 45
26. Het Bontbleugelige.	<i>Aux Ailes marquées.</i>	Mendica	12. 46
27. Het kleine Gelzoonde.	<i>La petite Couronnée.</i>	Lobata	12. 47
28. De Eenblak.	<i>à Une tache.</i>	Notata	12. 48
29. Het bonte Gelzoonde.	<i>La bigarrée Couronnée.</i>	Quadricornis	12. 49
30. Het gzoene Podagza.	<i>La Goutteuse verte.</i>	Gongylodes	12. 50
31. Het gestippelde Glasbleugelige	<i>Aux Ailes Diaph. mouchetées.</i>	Punctata	16. 58
32. Het verdozde Podagza.	<i>La Goutteuse brune.</i>	Flabellicornis	16. 59
33. Het Biddende.	<i>La Devote.</i>	Precaria	17. 60
34. Het Wegwijzende.	<i>Indique voye.</i>	Sancta	17. 61
35. Het gzoene Glasbleugelige.	<i>Aux Ailes Diaph. vertes.</i>	Oratoria	17. 62
36. Het rood en wit Geogde.	<i>Aux Yeux rouges et blancs.</i>	Annulata	17. 63
37. Het Bladerpootige.	<i>Aux pieds feuilletés.</i>	Subfoliata	18. 64
38. Het Gebandeerde.	<i>La banderole.</i>	Strigosa	18. 66
39. De gepurperde Geelband.	<i>La Pourpre à bande jaune.</i>	Ornata	18. 67
40. Het kleine donkere.	<i>La petite sombre.</i>	Fuscata	19. 68
41. Het oljifbladige.	<i>à Feuilles d'Olivier.</i>	Ovalifolia	19. 69
42. Het Gestippelde.	<i>La Pointillée.</i>	Pustulata	19. 70
43. Het Zwartgatje.	<i>La petite fesse noire.</i>	Sphingicornis	20. 71
44. De Glasblierk.	<i>à Ailes comme de verre.</i>	Hyalina	20. 72
45. Het Oranjeblakkige Gehooznde	<i>La Goutteuse Cornue à tache d'Orange.</i>	Fronticornis	20. 73
46. Het knielende.	<i>La Religieuse.</i>	Religiosa	21. 74
47. Het Bruine.	<i>La Brune.</i>	Aridifolia	21. 80
48. Het geele Zwaarlijbige.	<i>La jaune Corpulente.</i>	Diluta	22. 81
49. Het gzoene Dwergrse.	<i>Le Nain verdâtre.</i>	Nana	22. 82
50. Het gespeledewerkte Biddende	<i>La Devote à dentelles.</i>	Carolina	22. 83
51. Het Dwergrse met geele Oog- vlakken.	<i>Le Nain tache à Yeux jaunes.</i>	Gemmata	24. 91
52. Een Nymph.	<i>Une Nympe.</i>	Nympha	24. 92
53. De Diana.	<i>La Diane.</i>	Diana	24. 93
			25. 100
			Twee-

*Tweede Gezin.**Seconde Famille.**Familia secunda.*

			Tab. Fig.
1. Het Dijkblaklige.	<i>Aux cinq taches.</i>	Quinquemaculata	3. 9
2. Het gestreepte met smalle Bekschilden.	<i>La Raie à etuis étroits</i>	Attenuata	5. 16
3. De purpere Weerschijs.	<i>Le Reluisant pourpre.</i>	Versicolor	8. 28
4. Het smalle Gehooznde.	<i>L'étroitement Cornue.</i>	Oculata	10. 38
5. Het smalle Chineesche Ge- hooznde.	<i>Chinoise étroites Cornue.</i>		13. 53
6. Het kleinbleugelige Dunlijs.	<i>La corps mince à Ailes petites.</i>	Brachyptera	19. 71
7. Het groote Groene.	<i>La grande Verte.</i>	Rogatoria	25. 95
8. Het kleine Groene.	<i>La petite Verte.</i>	Rubicunda	25. 96
9. De groene Papillionaris.	<i>Le Papillonaire vert.</i>	Paradoxa	25. 99

